



D. a.

46

HORTI.  
MALABA.  
P. 7. 8.



DmT 1741, N,

Schwank

f4  
12  
d.

20




D a 46

Dir. 34





















H O R T I  
M A L A B A R I C I  
P A R S S E P T I M A,

DE VARIIS GENERIS

F R U T I C I B U S  
S C A N D E N T I B U S;

*Latinis, Malabaricis, Arabicis, Belgicis, Bramannum characteribus  
nominibusque expressis;*

Adjecta Florum, Fructuum, Seminumque nativæ magnitudinis vera  
delineatione, colorum viriumque accurata descriptione;

A D O R N A T A

*Per Nobilissimum ac Generosissimum D. D.*

HENRICUM VAN RHEDE TOT DRAEKESTEIN;

Toparcham in Mydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem, supremi Confessus apud  
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, nunc vero Equestris Ordinis nomine Illustribus  
ac Præpotentibus Provinciæ Ultrajectinæ Proceribus adscriptum,

*Notis adauxit, & Commentariis illustravit*

J O A N N E S C O M M E L I N U S

*In ordinem redegit, & latinitate donavit*

A B R A H A M U S A P O O T M. D.



A M S T E L A E D A M I.

Sumptibus Viduæ JOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van  
DYCK, HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM,

Anno cIdo Idc LXXXVIII.



H. O. R. T. I.  
M. A. L. A. B. A. R. I. C. I.  
P. A. R. S. S. E. P. T. I. M. A.  
F. R. U. T. I. C. I. B. U. S.  
S. C. A. N. D. E. N. S. I. B. U. S.



IV 503035



IV 503038

Biblioteka Główna PG		
Z zasobów PG	R-317/39	20 06



GENEROSISSIMO & NOBILISSIMO  
V I R O  
D I D E R I C O

BARONI DE BAER, ADSCRIPTO NOMINE DUCATUS  
GELDRIÆ CONSESSUI POTENTISSIMORUM ORDI-  
NUM GENERALIUM FOEDERATÆ BELGICÆ, ADSES-  
SORI JUDICII, CUI IN VELAVIENSI AGRO CURA  
SALTUUM ET REI VENATICÆ EST COMMISSA.



Mitto Tibi Septimum Malabarici horti Tomum, quem, tum ablega-  
tas causa publicæ rei apud extremos hominum Indos ago, meo  
jussu Amsterodami ediderunt, qui & priores tomos publicarunt  
Bibliopolæ. Nemini mortalium hoc munus acceptius quam Tibi  
accidere posse, mihi est exploratissimum. Novi Te curas  
& sollicitudines, quas maximas sustines in rerum publicarum  
procuracione, detergere quasi jucundissimo spectaculo florum &  
fructuum, quos fert hortus ille Tuus venustus & per quam delicatus. Qui ergo non  
possunt non grati esse tam eleganti rerum pulchrarum spectatori, quas Tellus omnium  
procreatrix ex fecundo suo sinu effundit benignissime, tot miræ & Europæis adhuc invisæ  
arbores & fructus, qui in ultimis Indorum terris proveniunt, quique fidem faciunt, vix  
aliam gentem esse, cui largius exquisitissima munera indulserit Natura, quam Mala-  
bares. Ne non dicam quam omnis, tam severioris, quam amœnioris & politioris do-  
ctrinæ sis cultor, & quanto cum dilectu genus omne librorum, qui non iratis Musis &  
Gratiis nati sunt, pares, evolvas, tuamque copiosissimam instruas bibliothecam. Hortus  
iste Malabaricus non dubitat quin & locum sit inventurus in tam illustri Musæo. Præ-  
terea necessitudinis & affinitatis jura, quæ semper coluimus religiose, quæque nos dudum  
junxerunt arctissime, non passa sunt hoc amicitiae monumentum, ad omnem posteritatis  
memoriam duraturum, Tibi diutius debere. Poterit, credo, hoc tibi persuadere nihil,  
quamvis longissime jam sum à vobis remotus, memoria Tui mihi carius & jucundius esse.  
Quod ut hic profiteor in oculis orbis terrarum, sic semper, quandocunque dabitur fa-  
cultas, testatum faciam, esse me

Generosissimo Nomini Tuo

addictissimum & observantissimum

HENRICUM VAN RHEDE,  
TOT DRAEKESTEIN.

AD



# ABRAHAMUS à POOT M. D.

L. B. S. P.



Andem, post alios, HORTI MALA-  
BARICI cura in me devoluta est: fuca-  
tis verborum lenociniis animos captare,  
multum jactare, montes polliceri, arenam  
dare, meum non est; *Septimam* tibi tradi-  
mus *Partem*, *Octavam* daturi, modo vitam  
protrahat Deus. Tu interim, C. L., fruire nostro la-  
bore ac vale.








*Natsjätam* Lat.

ጥጥር ጥጥር Mal.

*Garundo-pala*

ጥጥር ጥጥር Bram.

نَجْمَانْ Arab.



*Menispermum*

*Cocculus* L.



*Faint handwritten text, possibly a title or description, located at the top of the page.*





P A R S S E P T I M A.  
H O R T I  
M A L A B A R I C I,

D E  
V A R I I G E N E R I S  
F R U T I C I B U S S C A N D E N T I B U S.

N A T S J A T A M;  
N A T S J A M - C R U A;

A U T  
B A T T A V A L L I.

T A B U L A I.



*Atsjatam*; apud Bramannes *Garundo-Pala*; Lusitanos, *Fruita Matta Peire*; Belgis, *Waterquaad*, frutex est, cujus *folia*, in brevibus ac viridibus furculis, plura proveniunt, formâ cordis, antèrius cuspidata, vel etiam obtusiora, superficie plana, lenia, texturâ duriori, in parte anteriore ex fusco viridia, adversâ, diluta & furda, saporis subamari. *Flores* in racemis oblongis viridioribus hinc inde ex crassioribus erumpunt ramis, pedunculis brevioribus albicantibus insidentes: monopetali, quinque partiti, candidi, exteriora versus reflexi, apicibus flavis aspersi, odoris sambucini. *Gemmæ* rotundæ, virides. *Fructus* conferti, petiolis crassis, ex racemis oblongis cubitalibus pendent, ex albo virides, uvæ rotundæ formam referunt; primò albi, dein rubri, ad maturitatem proveci, nigri; nascitur in arenosis circa *Warapoly*, *Ang-caim ali*



*caimali* & aliis locis, semper virens. Integra Planta cum gingibere trita pannoque oblita, pedum clavos tollit. Radix cum bubuli fæcibus & arundine Indica concremata, per modum fumigii, idem præstat. Fructus capiendis piscibus & amovendis pediculis inserviunt.


## T A B. I.

Nobilissimus Dominus à Rheede primus est, qui perfectam nobis hujus plantæ dedit descriptionem & delineationem, quotquot enim antea de illa dixerunt, formam ignoravere, ut videre est apud Matthiol. lib. 3. Epist. pag. 136. Italis vocatur *Cuculo Indiano* & *Galuzza di Levante*; Pharmacopæis, *Coculus Indi*. Casp. Bauhinus in *Pinac.* nomen dedit *Coccula officinarum*; Cordus in suis Commentariis in Dioscoridem, *Solani furiosi Fructus*, nec absolum, cum *Solan* enim generi-

bus non malè convenit. Secundum notas genericas doctissimi Razi, *Hist. Plant. Tom. I. lib. 13. part 2. cap. 21. species Solani; Flores Monopetali, quinque partii aut stellati sunt, apicibus in umbilico oblongis, &c.* cum quibus figura florum justè convenit; commodè etiam, nostro judicio, inter illas referri potest. De usu & opinione variorum Authorum, vide Joh. Bauhin. *Hist. Plant. lib. 3. Cap. 155.*









*Tojeru-Caniram Lat.*

മലങ്കരക്കുടം *Mal.*

چھرو کھنیرام *Arab.*



*Daphne*

*polystachya. W.*







## TSJEREU-CANIRAM

V E L

## TSJEROU-CANSJERAM.

T A B. I I.




*Sjereu-Caniram* Malabarenfibus, Bramannibus *Tilo-Caro*, Lusitanis *Fruita Pardo pequeno*, Belgis *Klein Kraan oog*, species est *Caniram*; ramis rotundis, lignosis; cortice ex viridi fusco, ligno albicante, medullâ viridi. *Folia*, oblongo angusta in cuspidem acutum desinentia, in furculis propriis, ex brevibus proveniunt pedunculis, crassa, solida, superficie glabra, saporis amari & ardentis. *Flores* monopetali quadripartiti, in furculis foliosis extuberantes, petiolis viridibus, bini ac terni transversim erumpunt, & racematim excrecentes, numerum plerumque duodenarium implent, gemmæ speciem referentes, ex viridi albicantes, anterieus stricti, cuspidati stelliformes, exteriora versus reflexi. *Stylus* viridiusculus, cum sua gemmula viridi, in medio eminet, stamina nulla, nec calix, odoris expertes. *Fructus* baccae rotundæ ex viridi fuscae, cuspidem breviorē in vertice gerentes, intus nucleum album habent, saporis subamari. Nascitur circa *Poiga*, *Castello* & alia loca, semper virens, floret tempore pluviali. Succus ut & *Tsjétti Mulla*, ulcerosam scabiem & artuum dolores tollit.

VALLI.











Valli-caniram Lat.

വല്ലി കനറ Mal.

واللحم جاجهمان Arab.

कुवावाली Bram.



*Braunea*

*menispermoides* W.



شالو و لاجر و مال

فيلد ١٥ ١٥ ١٥





## VALLI-CÁNIRAM.

## TAB. III.



Ui Frutex Malabarenfibus *Válli-Cániram*, Bra-  
 mannibus *Roma-Válli-Caró*, Lusitanis *Fruita*  
*Pardao da Serra*, Belgis *Klein Kraan oog* dicitur;  
 species est *Cániram* seu *Nucis vomicae*, nascens  
 in declivi montium; circa *Paracavo* & alia  
 loca. *Radix* fibrosa est, saporis amari. *Cauliculi* tenues,  
 rotundi, virides: *cortex* amarus. *Folia*, hinc indè ex te-  
 nuibus petiolis viridi dilutis provenientia, oblonga sunt,  
 ad pediculum rotunda, anteriora versus in cuspidem con-  
 tracta, superficie plana ac glabra, parte superiori niten-  
 tia, ex fusco viridia, adversa communis viroris, saporis  
 amari & sylvestris. *Flores* fasciatim in longiusculis ac viridi-  
 dilutis petiolis, ex basi foliorum nascuntur, monopetali  
 parvi, flavi, trifoliati, rotundâ orâ in cuspidem contracti.  
*Stamina* in medio sex, parva, ex flavo albicantia, nigro  
 apice interius notata, inferius foliolis valde parvis in orbem  
 cincta. *Gemmæ* rotundæ ex viridi flavescent; apertæ, ob-  
 longæ sunt & flaviores. *Fructus* oblongo rotundi, parum  
 plani, inferiori parte contracti & angusti, primum virides,  
 dein flavi, minus stricti, crassiores & formâ magis oblon-  
 go rotundi; decidente flore racematim proveniunt, septem  
 vel octo; officulum in se continent oblongo rotundum,  
 strictum, superficie asperum, coloris primum candidi,  
 exsiccatum ex rufo fusci, saporis in totum amari. Floret  
 mense Majo, Junio & Julio, semper frondens. Morbum  
 curat sacrum. Decoctum foliorum, pustulas & ulcera  
 tollit, externè nempe applicatum. Folia trita, idem præ-  
 stant. Succus cum oleo *Coqui Indici* ana paptes æquales con-  
 coctus,




coctus, capitis & dentium dolores mitigat, spontaneam corporis lassitudinem tollit; cum cera ad unguenti consistentiam redactus, ulcera graviora & inveterata sanat. Radix trita & aqua *Oryzæ* permixta, humores pituitosos extenuat.



SCHÉ-







*Scheu-valli-caniram* Lat.

മെട്രാ ജെനറേറ്റം Mel.

جَهْرِيَّةٌ وَالْحَبَّةُ كَالْجَهْرِيَّةِ Arab.

कगदायेपेलो Bram.




*Daphne*

*monostachya* W.



Handwritten text in Arabic script, likely a title or heading.

Handwritten text in Arabic script, likely a subtitle or a line of text.





## SCHÉRU-VÁLLI-CÁNIRAM,

V E L

## SĴÉROU-VÁLLI-KANĴERAM.

T A B. I V.



*Chéru-Valli-Cániram*, Bramannibus *Davo-Roma-Cáro*; Lusitanis *Fruita Pardao Trapadeira*; Belgicè *Klein Klimmend Kraanoog*, species est *Cániram*. *Radix* longa, crassa, fibrosa; *cortex* cinereus, subdulcis; *lignum* subamarum. *Caulis* crassus, tortuosus ad altitudinem duodecim pedum affurgit, ramos quatuor cubito longiores transversim eiciens, cortice viridi, cinerea & scabra crusta obducto. *Rami*, duri, lignosi, cortice ex viridi fusco, nitente, longioribus, viridibus, spinosis eminentiis minuti, saporis amari. *Folia* furculis ramorum, ac etiam spinosis eminentiis, petiolis brevibus & viridibus insident, oblongo rotunda, antèrius contracta & in cuspidem desinentia, crispa, texturâ crassiori, densa, superficie, plana, anteriori parte fusco viridia, nitentia, amara. *Flores* monopetali, supra originem foliorum, in brevibus viridibus petiolis spicatim proveniunt, exteriora versus quadripartiti, reflexi. *Stylus* viridi dilutus cum capitulo viridi fusciori in medio eminet; *stamina* quatuor parva, tenuissima albicantia, flaviusculis apicibus dotata. *Fructus*, qui bini ternive petiolis parvis insident, baccæ sunt oblongo rotundæ, spiculâ parvâ in vertice eminentes, primò virides & nitentes, tum flavi, saporis subamari. Nucleus in officulo albus,  
nucis




nucis gustum refert. Nascitur circa *Panani*, *Catour* & alia loca; semper viret, florens tempore pluviali. Succus cum oleo decoctus & capiti impositus humores pituitosos elicit.



SCHERU-










*Tojeru - Katu - valli - Caniram Lat.*

തെളി പട്ടി കടലാ. *Mal.*

*Karo*

काचो *Bram.*


جَهْرُ وَالْبِي فَحَاجِيرَام *Arab.*



*Strychnos*

*minor.*







## SCHERU-KATU-VALLI-CÁNIRAM,

V E L

## TSJERU-KATU-VALLI-KAN SJERAM.

T A B. V.



*Scheru-Katu-Valli-Cániram*, vel *Tsjeru Katu-Válli-Cániram*, Malabarenfes; Bramannes Davo Cáro dicunt; Belgæ *Wild Klimmend Kraanoog*, species est *Cániram*. Rami cinericei sunt. Folia obscuro viridia; Flores monopetali, quinque partiti; Fructus curtis pedunculis ramis infident, globosi, deformes, minores quam *Cániram*, cortice glabro, maturi primùm flavescent, exinde rubescunt, Arantiorum instar, carne intus mucilaginosâ, oleosâ ac viscida, ex rufo viridi flavescent, tribus quatuorve gaudens cellulis, in quibus includuntur *Semina*, formâ pene ut *Cániram*, parum oblonga, plana, albicantia, cuspidata, quorum pulpa durior, nervosa, transparens. Fructus amari, semina minimè. Nascitur in insula *Baypyn* & intra *Cochien* & *Poaha* semper virens. Floret mense Augusto; Fructus mense Januario leguntur; contusi & capite impositi, maniacis profunt. Radix trita cum pipere, diarrhæam sistit & ventris cruciatus; cum oleo cocta & illita artuum dolores lenit.

T A B. I I. I I I. I V. V.

Omnes has species noster Author sub cognomine *Cániram* descripsit, cujus etiam mentio in prima parte hujus Horti facta. Nostram vero animadversionem in partem sequentem differemus, ubi de vero *Cáuiram* latius differendi non deerit occasio.


C

SCHEM












*Schembra - valli* Lat.  
 ചെമ്പ്രവള്ളി Mal.  
 جشمق وعالج Arab.  
 चाम्प्रा Bram.



*Vitis*

*indica. L.*



Page 100

WATER  
Bottle - 100  
100 - 100  
100 - 100  
100 - 100





## S C H Ê M B R A - V A L L I.

## T A B. V I.



*Schembra-Valli*; linguâ Braminum *Rana-Diacq*,  
 Lusitanorum *Uvas dos Bugios*, Belgarum,  
*Ape Druiven*. *Radix* nodosa quatuor quin-  
 queve crassas diffundit propagines, molles,  
 aquosas, exterius nigricantes, intus albescentes,  
 postea magis magisque rubescentes,  
 saporis aquei ast parum acrioris. *Caules* tenues, lignosi,  
 nodosi, lanuginosi, sub lanugine virides. *Folia* in nodulis  
 longiusculis, rubescentibus, crassiolis petiolis prodeunt,  
 antèrius cuspidata, in margine denticulis incisa, antèriori  
 parte viridi fusca, nitentia, candida lanugine obfessa; ex-  
 teriori viridia, splendida. *Flores* racematim in petiolis  
 crassis, rigidis, rubris, lanuginosis, è nodulis foliorum  
 oriuntur ac claviculos emittunt. *Gemmæ* primò virides,  
 dein ex viridi diluto albescentes & flavescentes; est autem  
 flos monopetalus, quinque partitus, cuspidatus, rubeus,  
 exteriora versus reflexus; gemma media subrubra, apice  
 rubro in vertice notata: staminula quinque subrubra, flavis  
 apicibus dotata, intra folia & mediam gemmam orientes,  
 è medio foliorum eminent. *Fructus* uvæ planè rotundæ,  
 initio virides, post hæc nigræ, crassiori tunica, medullâ  
 succulentâ, acidâ, intus quatuor trilaterata habentes gra-  
 nula, circa tunicam rotundiora, de cætero plana, coloris  
 dum immatura sunt, subflavi & nitentis, nucleo albo  
 instructa, saporis subamari & astringentis. Circa *Oedeam-*  
*pere*, *Candanata*, & aliis in locis invenitur. Continuo floret  
 & fruet, semper virens. Succus cum oleo mixtus  
 Ictē-




Icterus oculorum tollit. Radix trita, cum oleo & lacte  
*Coqui-Indici*, pustulas, carbunculos & apostemata sanat:  
 Succus radicis cum saccharo, catharticum est, humores  
 pituitosos evacuans.



VAL-










*Wallichia pira-pitica* Lat.  
വാലിഷ് പിറാപിറ്റിക്കു Mal.  
واليا پيرا پيٹيقتا Arab.

*Cissus*

*vitifolia* L.







## VALLIAPIRA-PITICA.

## TAB. VII.



*Allia-Pira-Pitica* Malabarenſes; *Catulama* Brāmannes; *Uvas d'Eliphandi* Luſitani; fruticem hunc nominant; Belgæ *Mansdruiven*. *Caulis* craſſus, nonnihil viſcoſus, adſtringens, ex viridi fuſcus. *Folia* in pedunculis oblongis, craſſis, ex viridi fuſcis, tortuoſis ac rigidis, intus ſulco profundo ſtriatis, ampla ſunt & tricuspidata, ad pedunculum ſemi rotunda, profunde exciſa, rigida, aſpera, fractu facilia, anteriori parte fuſco viridia, poſteriori magis diluta, ubi & coſtæ ramoſæ plus ſolitò eminent, ſaporis ſubamari, aſtringentis. *Flores* racematim provenientes, monopetali ſunt, quinque partiti, cuſpidati, ex viridi albicantes. *Stamina* quinque tenuia, apicibus albicantibus dotata: *Stylus* cum capitulo albicans. *Fructus* uvæ prægrandes, rotundæ, virides; intus pulpa ſucculenta, adurens, duobus vel tribus acinis inſtructa. Pro loco ſibi eligit denſa nemora in *Parœ Mangatti* & aliis locis, plerumque flores & fructus habet.


## TAB. VII.

Duæ hæ ſpecies ſunt ex genere uvarum ſylveſtrium & inter vites recenſeri debent, nam ſecundum earum notas genericas ſunt *Frutic. ſcandent. baccifer, foliis deciduis non ſpinosis, capreolis ſeu claviculis inſtructi, fructus racematim gerentes*; quamvis noſter Author non dicat quod folia annuatim decidant. Differentia enim Climatis mutatio- nem infer; in India & præſertim Bataviæ; ſecundum enarrationem *Nieuwbovyi* in ſuo *Itinerario*, pag. 227. vites ſemper virent, & diverſis temporibus maturos proferunt fructus, ut ſub illo calidiori cælo pluribus plantis accidit; nos ergo pro vite ſylveſtri habemus. Vide *Rajum Method. Plantar. Fol. 46.*













*Pallia - Tjori-nalli* Lat.

മലമുഴുവള്ളി Mal.

واليا جاري واللي Arab.




*Cissus*

*leucostaphyla*



Line 198





## VÁLLI Á-T S ʒ Ó R I-V Á L L I.

## TAB. VIII.




*Allia-Tsjóri-Válli* apud Malabarenſes, frutex eſt Bramannibus *Sjorallo*; Luſitanis *Uvas de Tove*, Noſtratibus *Pimperling* dictus. *Radix* lenta eſt & admodum fibroſa, cortice nigricante, intus ex ruſſo albicante: *Cauliculi* rotundi, teneriores, virides, geniculati, aſperi, claviculati. *Folia* in furculis aſperis ex geniculis radicum oriuntur, terna, quaterna, ac etiam ſolitaria, oblonga, angulis acutis eminentia; texturâ craſſa, denſa, plana, glabra, anteriori parte fuſco viridia, adverſâ diluta, ſurda; ſapor lancinans & adurens. *Flores* in furculis foliaceis racematim videntur, parvi, monopetali, quadripartiti, cuſpidati, ex viridi albicantes. *Stamina* quatuor flaviuſcula, noduloſa. *Gemmæ* albicantes, planæ. *Fructus* uvæ rotuudæ, grandiores, racemati, primò virides, exin albicantes, eburneæ. *Caro* mucilagiноſa, transparens. *Acini* oblongi cuſpidati, bini ternive in diſtinctis cellulis ſeparati, pelliculâ albicante arcte obteſti, unâ parte convexi, alterâ plani, duriores, ex ruſſo rubeſcentes; ſaporis in totum lancinantis. Naſcitur in *Berkercour*, & ſylvis denſis, ſemper frondens. Flores menſe Junio & Julio; Fructus Octobri & Novembri leguntur; aſthmati conveniunt.











Tsjori-valli Lat.

စာဒဝသတ္တိ Mal.

वाउववान् Bram.

Serbari-valli


چیا ری واللی Arab.



Cissus

carnosa. Vahl.







## T S J Ó R I - V Á L L I.

## T A B. I X.



*T* *Sjóri-Válli*; lingua Braminum *Cerberi-Válli*; Lusitanorum *Uvas D'ahofare*; Belgarum *Plat Pimperling*. *Radix* carnosæ, albicans, humida, viscosa, transversim incisa, striata, fibrosa. *Caulis* viridis, viscosus, intus carnosus, claviculatus. *Folia* ferrata, crassiora, mollia, glabra, lenia, striata, in brevibus sulcatis conspiciuntur petiolis. *Flores* racemati, monopetali, quadripartiti, ex rubro-fusci. *Stamina* quatuor, subflava, apicibus dotata, stylum medium arcte amplexentia. *Fructus* uvæ plano rotundæ, eadem forma ut *Belutta Tsjóri-Válli*, primo virides, tum albicantes & nitentes, dein rubescunt & cærulescunt, ultimò ex fusco in totum nigrescunt. *Caro* viscida est & mucilaginosæ, succo rubro cæruleo repleta; *Officula* triangularia sunt, quorum duo latera plana, tertium rotundum, rubescentia. *Locus* nativitatis est *Aroer* & *Moutan*. Ex foliis cum medulla *Nucis Indicæ* contritis, fit unguentum contra Colicam. *Radix* in aqua *Oryzæ* cocta & expressa, ulcera sanat.







قوله في قوله  
فانما هو في قوله  
فانما هو في قوله  
فانما هو في قوله

قوله في قوله  
فانما هو في قوله  
فانما هو في قوله  
فانما هو في قوله

قوله في قوله  
فانما هو في قوله  
فانما هو في قوله  
فانما هو في قوله



*Belutta-tsiori-valli* Lat.

බෙලුට්ටා ට්සිරි වාලි Mal.

*Serbazi-valli*

සර්බාසි වාලි Bram.

وَمَلُوكَا جِيَارِي وَاللِّي Arab.



*Cissus*

*pedata* Vahl.





83  
CO CO



## BELÜTTA-TSJORI-VÁLLI.

T A B. X.




*Elúttá-Tsjóri-Válli*; Bramannes vocant *Cérberi-Válli*; Lusitani *Uvas d' Aljafare Macho*; Belgæ *Pimperling Manneken*, species *Tsjóri-Válli*; eadem radice gaudens. *Cauliculi* rotundi, pilosi, intus lignosi, fragiles, claviculati. *Folia* ex adverso claviculæ prodeunt, in medio unum, ad latero duo, tria, quatuor, imo quinque, oblongo rotunda, cuspidata, ferrata, pilosa, aspera, anteriori parte ex viridi fusca, saporis acrioris & ardentis. *Flores* monopetali, quinque partiti, racematim ex parvâ & viridi fusca gemma oriuntur, odoris expertes. *Stamina* quatuor parva albicantia, juxta orbitæ ambitum erumpunt, flaviusculis apicibus instructa; *Stylus* brevior è medio centri emicat. *Fructus* racematim pendent, uvarum instar, formâ rotundo plani, spiculo muniti, in principio virides, postea albicantes, eburnei, splendentes, mollem, unctuosam ac pelludicam carnem continent, sapore admodum acri; officula unum, duo, quatuorve, unâ parte rotunda, alterâ plana; nucleus ex cæruleo albicans. *Repoli* & aliis in locis invenitur. *Folia* matura cum rasura *Nucis Indicæ* scabiem tollunt; cum oleo mixta & concocta vulnera sanant; succus calci admixtus, populas curat.

SCHU-



\_\_\_\_\_







*Schunambu-valli* Lac.

ചുണ്ണാമ്പിന്റെ വള്ളം Mal.

چونامبو والحي Arab.

कडुवालि Bram.




*Cissus*

*latifolia* Vahl.



Handwritten text, possibly a title or header, in a cursive script. The text is faint and difficult to decipher but appears to be written in a single line across the top of the page.





## SCHUNÁMBU-VÁLLI.

## T A B. X I.



*Schunámbu-Válli*, Malabaricè; Bramannibus *Cáda-Válli*; Lusitanis *Uvas d' Emfermos*; Belgis *Snoepdruiven*. *Radix* admodum fibrosa, filamentis contexta & albicans, plures emittit caules virides, hinc inde velut calce seu fariná albâ asperfos, nodulosos, claviculatos, molles, albissimo succo instructos. *Folia*, longis ac tortuosis petiolis è nodulis prodeunt, vel cauliculis transversis insident, grandia, oblongo-angusto-cuspide mucronato, tenuia, fragilia, anteriori parte fusca, adversa nitente, male olentia. *Flores* racematim in cauliculorum transversorum superiori parte visuntur, monopetali, quadripartiti, albicantes; gemmæ parviusculæ, stylum in medio habent, stamina nulla. *Fructus*, primùm oblongo rotundi, virides; posthæc rotundi, valde nigri, nitentes, molles, succulenti, unctuosâ carne repleti; saporis intensissime fervidi. *Ossiculum* ex cinereo nigricans est & rotundum; nucleus ex albo cæruleus. Ubique locorum invenitur modo densa adsint nemora. Ex palmitibus ejus corbes conficiuntur in quibus edulia reservantur, unde nomen *Cada-Valli*, nam *Cada* Bramannibus corbem notat. Insigne medicamentum hic frutex est; succus expressus cum oleo coctus, ac formâ emplastri adhibitus crassos digerit humores. Decoctum cum saccharo, in febribus ardentibus & pleuritide summo cum fructu exhibetur: Aqua ex trunco stillatitia cum saccharo idem præstat, tussim lenit, sanguinem purificat, vomicam pulmonum

F

curat.



curat. Radix trita & aquâ cocta odontalgiam amobet & foetorem gingivarum: cortex tritus incarnationem ulcerum promovet.

## T A B. VIII. IX. X. XI.

Omnes hæ species, ad genus hederæt pertinent, & inter illud recenseri debent; sunt enim, *Frutices bacciferi scandentes, non spinosi.*



MO.



THE HISTORY OF THE  
PLANT  
AND  
THE  
Fruit  
of the  
Tree  
of Life  
in the  
Garden of Eden  
by  
John Ray  
1703

PLANT. VII. X. XI. XII.





*Molagocodi* Lat.  
മളകുറുടി Mal.  
سنبه ملخاقيني Arab.  
മുളകുറുടി Bram.



*Piper*

*nigrum. L.*







## MOLAGÒ-CODÌ.

## TAB. XII.



*M*olagò quatuor sunt species: *Molagò-Codì*; *Cattu-Molagò*; *Cattu-Tirpalì*; *Capò-Molagò*. Bramannes *Mirì* vocant; Lusitani *Piamentæ*; Belgico Idiomate *Peper*; Piper est rotundum, Radice fibrosa, nigricante; Caules rotundi sunt, virides, lignosi, duri, nodosi, ex nodulis novos hinc inde cauliculos ejicientes. Folia quæ brevibus, crassis, viridibus & interius striatis petiolis ex nodulis erumpunt, oblongo rotunda, antè cuspida, in medio latissima, texturâ crassiori & solidâ, superficie planâ, viridis anteriori parte fusci & nitentis, exteriori clari. Flores spicati in petiolis viridi dilutis conspiciuntur, monopetali, circa extrema tripartiti; Gemmæ viridi dilutæ & flavescentes, intus acinum parvum, viridem, ac in vertice nigricantem, rudimentum fructus, habent. Fructus, acini rotundi, racematim in petiolo viridi, viginti imò triginta simul proveniunt, primum virides & æquali superficie, dein rubri; ad maturitatem perducti decerpuntur, solique per septem octove dies exponuntur, à quo tempore cortex nigrescit. Semel quotannis floret hæc planta, vel etiam bis, si vigetior est, mense Julio; quarto mense post flores, colliguntur fructus. Nascitur per totam Malabariam. Cortice nigro ablato fit piper album: Colitur per fragmenta ramorum terræ intrusa. Folia & fructus saporis sunt acrioris, vegeti, sicci. Tota hæc planta in pulverem redacta ac cum butyro cocta, pustulis aurium confert. Radix trita & in aqua communi decocta, pro lavamento oris adhibetur, catharros enim & gingivæ affe-



affectus tollit. Fructus tritus cum aqua calida sumptus, feбри ardenti in morbo sacro medetur; dolores ventris ac flatus discutit, podagram tollit. Oleum ex pipere destillatum, tenue est, valde clarum & flavescens, levem piperis odorem spirans, saporis parum acris.

## T A B. XII.

*Molagè Cadi*, vel *Piper rotundum nigrum* apud *Baub.* in *Pinac.* a *Zanonio* in suo *Catalago Molag* dictum, rectè quoad formam & figuram hic à nostro Authore describitur & exhibetur; qui & differentiam inter *Piper nigrum* & album accuratè an-

notavit, cum varii ante illum Authores hic hallucinati sint, excepto *Pisone* in sua *Mantissa Aromatica*, ibi enim *Lada* plantam hanc & *Molanga*, sive *Piper Aromaticum Mas*, nominat & pluribus de ea tractat.









*Cattu-molago* Lat.

കാട്ടു ചെളി കൈ *Mal.*

قُطَا لَوْحًا مُخَوِّفِي *Arab.*

சரி *Burm.*




*Piper*

*Siriboa* L.



Page 10

Handwritten text in Arabic script, likely a title or heading, possibly reading "كتاب" (Book) and "في" (in).





## CÁTTU-MÓLAGO.

## TAB. XIII.



Alabarensium *Cáttu-Mólago*; Bramannum *Davo-Miri*; Lusitanorum *Piementa-Domato* est; Belgæ dicerent *Witte Peper*; planta plane sylvestris, nec unquam apud Indigenas pro pipere venit, insipida nempe est, quamvis quoad formam cum vero pipere maximè conveniat. *Caules* sunt virides, striati, minus lignosi. *Folia* ex geniculis caulium oriuntur, ad petiolum sulcata, oblongo angusta, parum rotundiora, lata, textura crassa, dura; viroris interius fusci, exterius clari. *Flores* iidem, ut & fructus, sed majores, semel quotannis florens. Succus ut & *Cáttu-Tirpalí* simul expressus cum butyro sumptus tussi convenit.

## TAB. XIII.

Figura *Cáttu-Mólago*, imperfecta est, flores enim & fructus desunt, non malè autem cum | *Pipere samineo Pisonis* convenire videtur.












*Cattu-tirpali* Lat.  
 കറ്റകുളി Mal.  
 قحطاً طحوت عالجى Arab.  
 कपडा Bram.



*Piper*

*longum. L.*







## CATTU-TIRPALI.

## T A B. X I V.



*Attu-Tirpali*, tertia species est Mólago, Bra-  
mannibus *Bipali*; Lusitanis *Pimenta Longa*  
dicitur; Belgicè *Lange Peper*. *Radix* fibrosa,  
nigricans. *Caules* rotundi, virides, nodulati,  
minus lignosi, novos hinc inde ejiciunt  
furculos claviculatos. *Folia* circa nodos caulium, lon-  
gissimis internè striatis petiolis erumpunt, formâ ut Cattu-  
Malogo, ast longiora, minus cuspidata, fuscioris viroris  
quàm Molagò-Codì, circa basin incisa, texturâ valde  
tenui & molli, superficie lenia, viroris in recta parte  
fusci, in sinistra clari; differunt à Cattu-Mólago, quod  
cum costa media duæ vel tres aliæ tenuiores excurrant,  
quarum inferior arcuato ductu nervulos transversos ver-  
sus marginem emittit, utrinque eminentes. *Flores* mo-  
nopetali, quinque vel sex partiti, arctissime *fructibus*  
insidentes, qui oblongo rotundi sunt, spiris obliquis pa-  
rallellis in superficie ex diversis partibus striati, in spirarum  
intersectionibus veluti parvis rotundis foliolis scutiformi-  
ter obducti; inter spiras gemmæ apparent quibus flores  
insederunt, eminentes & nigricante puncto notatæ,  
primò ex viridi flavæ, carne intus ex flavo albicante; dein  
viridi fuscae, carne viridi fusca; maturæ & siccae ex ci-  
nereo nigricantes. In fructibus transversim dissectis in-  
terstitia videntur, in quibus semina oblonga & nigrican-  
tia continentur. Colitur multis in locis, semel quot-  
annis, tempore nimirum pluvioso, floret. Piper tri-  
tum



tum affectibus oculorum & febribus intermittentibus  
inservit.

## T A B. XIV.

*Piper longum Orientale* juxta *Bauh. in Pinac.* No-  
tandum in hac figura, quod Fructus planta ad-  
huc virente delineati, atque ideo tam crassi &  
pleni sunt; exsiccati enim multo tenuiores  
& longiores, ut videre est apud *Clusium in Exoti-  
cis lib. 1. Cap. 20. Piso in Mantissa Aromatica Cap. 8.*

figuram nobis exhibet cujus folia non bene de-  
picta, unicam enim in medio tantum costam  
habent, cum revera quinque sint quæ ad mar-  
ginem usque excurrunt; apud *Clusium* æque vi-  
tiosa, quando cum hac nostri Authoris compa-  
ratur.



**BEET.**








*Beetla-cori* L.  
 വെളുലക്കൊട്ടി Mal.  
 وَخَيْطَل فَاضِي Arab.  
 पानवाले Bram.



*Piper*

*Bette. L.*







## BEËTLA-CODI.

TAB. XV.



Malabarensum *Beëtla-Codi*, Bramannum & Lusitanorum *Beëtla*, notissima illa apud omnes exteros herba *Bethel* est, quæ per totam Indiam supra *Oryzam* & frumentum comeditur, ac maxima cum cura excolitur. *Radicem* habet fibrosam; *Caules* virides, rotundi, glabri, nodulati, supra nodulos extuberantes. *Folia* petiolis longiusculis, crassis, interius striatis, ex nodis caulium proveniunt, oblongo-rotunda, cuspidata, texturâ crassiora, mollia, glabra, viroris fusci & nitentis; saporis astringentis; majora nullius sunt usus; minora quæ in tenris transversis furculis nascuntur mollia sunt, & cum *Areequa* addito momento calcis ab indigenis quotidie manducantur, saporis subacris & grati, labia & salivam colore rubro tingentia; si minus calcis addatur saliva ex flavo fusca est, sapor astringens & nonnihil adurens; si plus minus rubra, ardens. Genus est *Areequæ*, Malabarensis *Schorikema-Adeca*, Bramannibus *Areequa-Bebeda* hoc est, inebrians dictus; medulla interior rubescens cum *Bethel* mansa cerebrum offendit; cum radice vel fructu *Bellacà*, vel cortice *Elengi* & *Olla-Pulli* & exigua quantitate calcis salivam tincturâ rubrâ implet. Est & peculiaris species *Beëtla Codi*, sed rarior, cujus folia saporem garyophyllorum æmulantur. *Flores* monopetali, quinque, sex, septemve partiti, in brevibus petiolis ex nodis erumpentes proveniunt, albi, at cum exsiccati sunt nigri; capitula odoris sunt amoeni, cum tempore magis magisque viridescentia.

TAB. XV.

Casparus Bauhinus fruticem hunc *Tambul*, *Avicenna* *Tambul*, *Garzias* ab Horto *Berre*, *Clusius* *Belle* nominavit. Conspicies est *Piperis longi*. Differentiam inter folia *Piperis* & *Bethel* doctissimus *Fabius* demonstravit ut & *Ant. Recchius* in suis Annotationibus in *Nardum*, cap. 37. pag. 876. ubi prolixè de eo tractat; nemo autem meliorem unquam delineationem exhibuit, præter nobilissimum Do. van Rhee.

H

AMO.











*Amolago* L.

ആ. വേറ്റുക *Mal.*


أملغ *Arab*



*Piper*

*Amolago* L.







## A M O L A G O.

## T A B. X V I.



Ui frutex Malabarenfibus *Amólago*, Bra-  
 mannibus *Mirisso*, Lusitanis *Pimento* *Ma-*  
*cho*, Belgis *Peper het manneken* vocatur, species  
 est Malógo; *Caulibus* rotundis, geniculatis, in  
 exortu internodiorum erumpentibus. *Foliis*  
 ut Mòlago, sed spissioribus, virore saturis,  
 odore Piperis, sed minus vegeto. Loco florum virides  
 habet ligulas, ad longitudinem extensæ manus, bullulis  
 cuspidatis obsitas; duobus albicantibus apicibus, qui postea  
 nigrescunt, instructus, saporis acris & aromatici. Nasci-  
 tur in sylvis *Couroer* & aliis locis. Floret tempore pluvioso.  
 Nullius est usus.

## T A B. X V I.

*Amólago* species sylvestris est *Piperis longi*, & se- | les species porro recensentur. Vide *Casp. Bauh.*  
 eundum nostrum Authorem extra usum. Simi- | *Pin. lib. XI. sect. 3. pag. 412.*











Katu-Kara-Walli Lat.

കുടവു Mal.

Jalil

നാലി Bram.

قنار Arab.




Pisonia

aculeata. L.



Handwritten text, possibly a title or header, in a cursive script.

Handwritten text, possibly a date or a list of items, in a cursive script.





## KATU-KARA-WALLI.

TAB. XVII.



*Atu-Kara-Walli* Malabarenses; *Fasil* & *Sato-Val-Gali* Bramannes; *Fruita Patao* Lusitani; *Salk-Doorn* Belgæ hunc fruticem nominant; *Ramos* habet rotundos, geniculatos, geminatis supra geniculos oblongis, cuspidatis, lignosis spinis instructos; spinæ teneriores in tenerioribus ramis, superius surgunt; in densioribus reflexæ sunt. *Folia* geminata transversim in geniculos infra spinas proveniunt, oblonga, in cuspidem stricta, tenuia, interiori parte lenia, viroris nitentis, exteriori in qua ex costa media, laterales obliquo ductu egrediuntur ac extuberant, scabra, coloris diluti & surdi. *Flores* supra exortum foliorum, proxime ad spinas in petiolo brevi & nonnihil lanuginoso pendent, monopetali, quinque partiti, cuspidati, coloris viridis ac flavescentis: ex foliorum interstitiis quinque apices fusci emicant; in medio stylus est, ad pedem lanugine alba obductus, cum capitulo flaviusculo in vertice; nullius odoris. *Gemmæ* virides. *Fructus* iidem cum *Walli-Kara*. Nascitur cirra *Klein-Man-gatti* & aliis locis sublimioribus: semper vel flores vel fructus habet & extra usum est.


TAB. XVII.

Frutex hic commodè inter species *Rhamni* ponitur.












Valli-Kara Lat.

ou 32 Jazv Mal.

Anti

काटी Bram.


واللي قناع Arab.



Neussia

sarmentosa.







## VALLIKARA.

## TAB. XVIII.



*Valli-Kára* Malabarenfes, *Fruita do Cao*, Lúfitani, *Hondsbeffen* Belgæ dicunt; frutex est finuofis ramis fe arboribus affigens ac circumvolvens. *Radix* cortice rubro fanguineo & cinereâ cuticula cruftatus, lignum habet album, interius ex cæruleo rubescens. *Stipes* è radice exiens craffus, lignofus, cortice cinereo, intus medullâ albicante fungosâ gaudens; furculi vetuftiores etiam cinerei, cortice viridi, teneri fpadiceo fufci, villofa & mucilaginofa lanugine induti. *Folia* ex petiolis longiusculis, tenuibus, viridi dilutis ac muscosis pendent, adversâ parte lenia & villosâ, interiori breviffimis pilis instructa; odoris, cum teruntur acuti & non ingrati. Cum costa media utrinque lateralis prodit; exteriori parte eminentes. *Flores* fupra originem foliorum fpiratim in brevibus petiolis cernuntur, monopetali, quinque partiti, exteriora verfus reflexi, funtque gemmulæ rotundæ, muscosæ, ex viridi flavescentes; circa difcum flavescentem quatuor fefe breviffima erigunt ftamina, fingula fuis nodulis flavis dotata, ac farinaceo rore afperfa; odoris grave olentis. Post deciduos flores fequuntur *Fructus*, globuli virides & muscosi, cortice, cum vetuftiores funt, ob punctula eminentia afpero, intus viridi, bini mutuo uniti, ac in vertice transverfo communi ex ruffo fufco umbilico confuti & ftriati; intus unicum rotundum & totam capiactatem replens, femen habent; quod cortice  
fic.



ficcato ac fisso sponte prodit. Natale solum est prope *Cochin* circa *Paloerti*, & in aliis locis, semper florens vel frugens. Semen cum oleo & croco coctus, rabidi canis morsum frustra facit, modo in tempore adhibeatur.


## T A B. X V I I I.

*Valli-Kara* pertinet inter *Frutic. baccif. scandentes*, à nemine quod sciam descriptus, inter *Solani* species recenseri posset, ut *Dulc-Amara*. Vide Doctissim. *Rajum Hist. Plant. Tom. I. lib. 13. part. 2. Cap. 21. de Solano.*



P E E.









*Pee-amerdu* Lat.

പേ ഏ റു Mal.

*valli-amerdu-valli*


वलि अमरुत वलि Bram.

سبخ سميرضخ Arab.

*Menispermum*

*malabaricum. L.*













*Pee-amerou Lat.*



*Menispermum*

*malabaricum. L.*







## P E E - A M E R D U.

T A B. X I X. X X.



*Eè-Amerdu* apud Malabarenſes, quem Bra-  
mannes *Vallu - Amerdu - Valli*, & *Genam* no-  
minant; Luſitani *Trapadeiræ de Ceo*; Belgæ  
*Windwortel*, ſpecies *Amerdu* eſt. *Radix* fi-  
broſa, capillata, cortice rufo-fulco, intus  
lignoſo, æque intra ac extra terram, imo  
funiculo ſuſpenſa, & aëri expoſita, non tantum creſcit  
ſed & floret & fruget, quod etiam nudi faciunt rami.  
*Caules* ac furculi rotundi ſunt, tortuoſi, lenti, flexiles,  
teneri virides, albicantibus & veluti lanuginofis pilis ob-  
ſiti; vetuſtiores cortice exteriori cinericeo, interiori vi-  
ridi, filamentis intus lignoſis albicantibus ſeu flaviuſculis,  
laxis, carne fulcoſa ac mucosa interpolati, per texti,  
tam è ſuperiori quam inferiori parte radicis propagantur,  
primò ut tenuiſſima filamenta, molles, flexiles & cine-  
reo virides; de hinc ad pollicem craſſi. *Folia* hinc inde ad  
caulium ſeu ramorum flexuras, petiolis oblongis, rotun-  
dioribus, pilofis, ad exortum parum extuberantibus, pro-  
veniunt, formâ lata, anterieus cuspide anguſto & oblongo  
eminentia, ad petiolum ſinuofa, & pilis, maximè in ad-  
verſa parte veſtita, lanuginofa, in anteriori pili aſperiores  
ſunt, texturâ laxâ & fragili. *Coſtæ* tam media quam  
laterales adſunt, poſteriori parte eminentes. *Flores* in  
petiolis viridi dilutis, ſupra ex origine foliorum prodeunt,  
numero plures, tenuiſſimis ac viridi dilutis & albicanti-  
bus pædunculis; monopetali, tripartiti, parvi, nitentes,  
in medio tenui venulâ ſtriati; in medio quaſi roſa ſpecta-  
tur, in qua ſex ſtamina albicantia emicant, nodulis flavis  
& ruſſis, quæ in gemmis albeſcunt. *Gemmæ* rotundio-  
res, ſuperne non nihil planæ, ad petiolum ſtrictiores,  
virides; nullius odoris. *Fructus* racematim ſpectantur ac  
terni pedunculis brevioribus, tranſverſis, viri dilutis,  
flaveſcentibus infident & ex ſingulis floribus oriuntur,

K

ob-



oblongo rotundi, primùm virides, post flavescentes, dein corallini ruboris & nitentes, intus viscido, moscoso humore repleti, non semper æque magni, sed differentes: in medio officulum habent grande, oblongum, parum complanatum, scabrum & exasperatum, primum albicans, dein nigrescens: Nucleus albus est. Nascitur in *Warapoli* & *Mouta*, semper florens & frugens. Balneum ex hac planta & *Nela-Panna-Scelengu* præparatum abscessus inveteratos curat: *Folia* cum *Carique de Bengala* & *Caraga* mixta, vel cum cortice *Alu* & *Sergelim* in lacte vaccino cocta, exanthemata resolvunt. Pulvis ut & nuclei *Mangæ-Saltæ* fissuras pedum consolidat; cocta cum aqua *Oryzæ* pedum ulcera mundat.











Āmerdu Lar.  
अमरु दु Mel.  
āmerdu - vālli  
अमरु वल्ली Bram.  
جيت عماره Arab.

*Menispermum*

*cordifolium.* 38?







## CIT-AMERDU.

## TAB. XXI.



*It-Amerdu*, species *Peè-Amerdu*, nihil differens, nisi quod flores & fructus sint minores. Decoctum cum summo fructu in febribus ardentibus, arthridite, & ictero adhibetur, vires reficit. Ex succo & *Colutpæ* ac *Tirra-tali* cum lacte balneum antispasmodicum præparatur. Tenerrima folia cum *Eamâcciam* & lacte trita, linimentum dant in Phlegmone & Erysipelate. Succus, ut & *Mulcenti*, *Tsjéru-Pulla* & *Ulinja* expressus, puris generationem præpedit & ulcera sanat. Succus caulium ablato cortice, cum lacte & aqua decoctus, & ad ficcitatem evaporatus, ac oleo foliorum de *Enfermo* mixtus, linimentum Antiarthriticum est: cum saccharo potus cachexiam tollit; cum Pipere longo pituitæ intemperiem; cum saccharo & pipere longo bilis dyscrasiam & morbum articulare corrigi.




## CITAMERU

## T A B. X X I.

la-  
 rens, nisi quod flores & fructus sunt minus  
 res. Decoctum cum summo fructu in se-  
 ribus ardentibus, ardentibus, & ictu  
 adhibetur, viceretur. Ex succo & cera  
 ac luteum cum lacte balneum annispatum  
 dictum praeparatur. Tenebris folia cum Eucalypti  
 lacte trita, limentum dant in rheumatismo & hystericis.  
 Succus, ut & Alkama, Iper-  
 puris generationem praepedit & ulcera sanat. Succus cum  
 humi ablato cortice, cum lacte & aqua decoctus, & ad  
 licetate evaporatus, ac oleo foliorum de Euphorbia mixtus,  
 limentum Antisthenicum est: cum saccharo potus ca-  
 chexiā tollit: cum pipere longo pituitae interperit;  
 cum saccharo & pipere longo bilis dyscrasiam & morbum  
 articulare corrigit.










*Tha* Lur.  
*Tha* Mal.  
*Macaranga-gongoli*  
 मकराङ्गली Bram.  
 ثوآ Arab.

*Thoa*

*edulis* W.







## U L A.

## T A B. X X I I.



*V*La, Bramannes *Oulasso* vel *Macuda Gan-*  
*goli*; Lusitani *Fruita Pemacho*; Belgæ *Harlaar*  
dicunt; *Ramos* habet lignosos, albicantes,  
duros geniculatos, nodosos, extuberantes;  
cortex exterior niger est & cinericeus ma-  
culis hinc indè notatus, interior viridis,  
tener. *Folia* ex furculis rotundis, viridi fuscis, genicu-  
latis gemina, decussato ordine, oblongo rotunda, textu-  
rà spissa & solida, superficie plana & glabrâ, anteriori parte  
fusco viridia, nitentia, exteriori virore saturata, parvis &  
crassioribus pedunculis, interiori parte planis proveniunt;  
*Florum* loco sunt ligulæ oblongæ, rotundæ, piper oblon-  
gum referentes, annulis nigris seriatim interstinctæ, in  
interstitiis viridi dilutæ; annuli tenuissima, brevissima,  
nigra habent staminula, apicibus minutissimis & viridi  
dilutis dotata; ex geniculis ramorum vel solitariae vel tres  
simul erumpunt; floret mense Januario; staminulis deci-  
sis parvæ virides gemmæ, circa annulos in orbem prodeunt  
ac in *Fructus* excrescunt, formâ exactè oblongo rotundi,  
in vertice minutissimum cuspidem habentes, calice viridi  
fusco & crasso: caro interior ex viridi albicans, nucem  
oblongo rotundam in se continet, duro putamine, pilo-  
sam ac hirsutam; nucleus ex albo flavescit, quem mem-  
brana albicans interius ambit, saporem refert castaneæ ac  
inter edulia recensetur. Nascitur circa Calicut & in aliis  
locis.



## U L A


## T A B X X I I

La. Germanicus Onassis vel Malabaricus  
 goli. Lusitani Famae T. canabos; Belgae Haman  
 dicunt; Rami habet lignos, albicantes  
 duros geniculatos, nodulos, extabantes  
 cortex exterior niger est & cinereus  
 cuius hinc inde notatus, interior viridis



tenet. Folia ex nervulis rotundis, viridi sulcis, genicu-  
 latis geminis, decussato ordine, oblongo rotunda, textu-  
 ra spissa & solida, tubercula plana & glabra, antecio-  
 fisco viridia, nitentia, exteriori vincta, parvis  
 crathionibus pedunculis, interiori parte procreantur;  
 Folia locorum hinc oblonga, rotunda, super obli-  
 qua rotunda, nervulis nervis laticulis intersticiis, in  
 intersticiis viridi colore; annuli rotundi, brevissimi,  
 nigra habent laticulis, spissis, nervulis & viridi  
 dilutis coloribus; ex geniculis, annulis vel solutis vel  
 fimbriatis; hinc intersticiis, laticulis de-  
 cussatis, nervulis, annulis, laticulis, intersticiis  
 in vertice nervulis, laticulis, intersticiis, calice viridi  
 fisco & crasso, raro interior ex viridi albicans, nucer-  
 oblongo rotunda in se coarctata, duo putamine, pila-  
 iam ac hinc; nucer ex albo thalio, quam nuer-  
 brana albicans intersticiis, laticulis, intersticiis, ac  
 inter edulis recedunt. Noster cum Calice & in alio  
 loco









Pec-Vla Lat.  
 ۲۳۳ Mal.  
 ۲۳۳ Arab.

*Amyris*

*Protium* ۳۸.







## P E E - U L A.

## T A B. X X I I I.



*Peelu*, Bramannes *Gangoli* & *Oulassani*; Lusitani *Penacho Macho* dicunt; nostrates *Harlaar Manneken*. Frutex est radice lignosâ longe prorepente, ligno duro ex albo flavescente, medulla ruffa cum tenui corticula teneri & squammosa. Rami nodosi, cortex spadiceus, vetustior ex cinereo fuscus, circa lignum ex viridi flavesceus, ipsum lignum albicans. Folia passim geminata ac etiam quaterna, in nodis ramorum brevibus petiolis, interius lato sulco striatis, proveniunt; oblongo rotunda sunt, crassa spissa & solida, superficie plana & glabra, viridis fusci & nitentis, in parte adversa dilutioris. Gemmae rotundae sunt, supernè in cuspidem strictae, ex viridi fuscae. Flores, supra originem foliorum in ramis oblongis racematim proveniunt, & pedunculis parvis viridibus appendent, ex viridi diluti, oblongi, passim octo petalis cuspidatis constantes, exterius quatuor oblongioribus & viridi dilutis stelliformiter expansis, interius similiter quatuor albicantibus & obtuse cuspidatis, quæ singula inter duos cuspides externos interjacent, intus flavo circulo signati. Stamina sex vel octo habent pro numero petalorum, albicantia, croceis apicibus instructa: stilus oblongior, crassior ac viridi dilutus; marcescentibus floribus stamina rubescunt. Fructus nulli: usus huc usque incognitus. Nascitur circa *Bellange* & in aliis locis, florens tempore pluviali.

## T A B. X X I I. &amp; X X I I I.


Quamvis hæ duæ plantæ idem cognomen habeant, tamen nulla inter illas convenientia, nisi quæ in descriptione Authoris nostri acquiescentes, de illarum ulteriori indagine supersedebimus.

B. R. A.











*Basella* Lat.

வரகு Mal.

Wali

ବାଜି Brm.

بازي Arab.



*Basella*

*cordifolia* Lam.







## B A S E L L A.

## T A B. X X I V.



Rutex qui Malabarensibus *Basella*; Bra-  
mannibus *Wali*; Lusitanis *Bredo-Tali*; Belgis  
*Beetklim* dicitur. *Caules* aquei sunt, ex unâ  
parte virides, alterâ versus solum ex pur-  
pureo rubescentes. *Folia* in pedunculis  
crassis, brevioribus, interius striatis & viridi  
dilutis proveniunt, ampla, cuspide obtuso. *Costæ* in  
adversa parte crassæ, viridi dilutæ & albicantes. *Flores*  
cyathiformes, tetra vel pentapetali, inferius ex viridi al-  
bescentes, superius ex purpureo rubescentes. *Stamina*  
quatuor vel quinque; quorum apices in medio ruffi.  
*Fructus* cauliculis insident, supra exortum foliorum,  
numero sex, septem vel octo, suntque baccæ plano ro-  
tundæ, quatuor quinqueve rotundioribus interstitiis in-  
structæ, primò virides; maturæ ex rubro nigricantes  
& nitentes, saporis aquei subdulcis; intus carne suc-  
culenta, cujus succus expressus, tincturam ex purpureo  
rubram præbet. *Officulum* in medio albicans, in quo  
nucleus albus. *Lignum* cum foliis tritum carbunculos  
aperit; inter edulia habetur; Colitur in hortis.

## T A B. X X I V.

*Basella* hæc a Zanonio *Basila* dicitur. Semen : cus ex fructibus expressus commodissimè pro  
A°. 1685. ex Ceylon transmissum, in horto | miniatura utitur. Planta hæc longæva est, sed  
Medico Amstelodamensi, plantam produxit; | quam cautissime pro frigore conservanda. Flo-  
non sub Beta sed Bryonia recenseri potest. Suc- | rum figura in delineatione plus debitò major.



BASILLA

TAB. XIX


Index qui Malabaribus Basilla; Bras-  
mannibus Wab; Lusitanis Bardo-Vab; Belgis  
Basilla dicitur. Cane apertum, ex una  
parte virides, altera versus solum ex par-  
te rubescentes. Folia in pedunculis  
crassis, brevioribus, interiora breviora & viridi-  
bus proveniunt, simplicia, crispide obtusa. Costa in  
adversis parte crassa, viridi dilute & asperant. Flos  
cyathiformis, rectus vel perispermus, interior ex viridi al-  
bescentes, laciniae ex purpureo rubescentes. Stamina  
quatuor vel quinque; quorum apices in medio trahi-  
bus. Cariculis insident, supra exortum foliorum;  
nuncio sex, septem vel octo, singulae baccas planas to-  
tante, quatuor quinqueve torquidibus interstitiis in-  
terstitiis, primo virides, maturae ex rubro nigrescentes  
& asperae, sapore adque subdole; in eis carne lac-  
culosae, cuius laccus expletus, speciem ex purpureo  
rubram praebet. Oculum in medio albidum, in quo  
nucleus albus. Lignum cum foliis citrum caribolicum  
aperit; inter edulis habetur; Collitur in hortis.



TAB. XIX

Basilla; Bras-  
mannibus Wab; Lusitanis Bardo-Vab; Belgis  
Basilla dicitur. Cane apertum, ex una  
parte virides, altera versus solum ex par-  
te rubescentes. Folia in pedunculis  
crassis, brevioribus, interiora breviora & viridi-  
bus proveniunt, simplicia, crispide obtusa. Costa in  
adversis parte crassa, viridi dilute & asperant. Flos  
cyathiformis, rectus vel perispermus, interior ex viridi al-  
bescentes, laciniae ex purpureo rubescentes. Stamina  
quatuor vel quinque; quorum apices in medio trahi-  
bus. Cariculis insident, supra exortum foliorum;  
nuncio sex, septem vel octo, singulae baccas planas to-  
tante, quatuor quinqueve torquidibus interstitiis in-  
terstitiis, primo virides, maturae ex rubro nigrescentes  
& asperae, sapore adque subdole; in eis carne lac-  
culosae, cuius laccus expletus, speciem ex purpureo  
rubram praebet. Oculum in medio albidum, in quo  
nucleus albus. Lignum cum foliis citrum caribolicum  
aperit; inter edulis habetur; Collitur in hortis.







*Curinil* Lat.

കുറിഞ്ചി Mal.

कुसुमलि Bram.

فخر بنجيل Arab.



*Reinera*

*baypinensis*.







CURINIL *vel* CURIGINIL.

TAB. XXV.




*Curinil* vel *Curigil* Malabarenfes; *Thali* & *Kennapa* Bramannes; *Crica da Velha Pequena* Lusitani; *Klein Hondepint* Belgæ dicunt. Species est *Perim-Curigil*; vide descriptionem *Tab. 24. Part: 6.* Surculos habet rotundos, geniculatos, in geniculis nonnihil extuberantes, intus lignosos, cum corculo viridi. *Folia* in geniculis geminata, decussato ordine videntur in petiolis oblongis ac flaccidis, oblonga, cuspidata, texturâ mollia, flaccida, superficie planâ & glabrâ, viroris in recta parte saturi, in adversa dilutioris odore & sapore destituta. *Costa* media ex viridi albescens & in adversâ parte eminens, plures laterales emittit. *Flores* fasciatim proveniunt pentapetali ex albo flavescentes, exterius virides, interius candido, lanuginoso uncinulo vestiti; in medio globulus est rotundus, quinque staminibus parvis succinctus. Nullius sunt odoris. *Florum Gemmæ* oblongo rotundæ, in vertice albicantes. *Fructus* oblongi sunt, cortice viridi claro, carne albicante subhumida, saporis subamari; ossiculum in se continent durum & albicans, quod nucleum album includit, cuius sapor subamarus & nonnihil adstringens. Natale solum est insula *Baypim*, semper frugens. Foliorum succus loco balnei adhibetur, adversus tumorem quem Malabarenfes *Tsjádeunir*, nuncupant; radix in aqua oryzæ cocta & pro potu usurpata, idem præstat.











*Surigi-tali* Lat.  
சுரிகதலி Mal.  
فَوْحِيَّةٌ مُعَلِّي Arab.  
ஈகி Bram.



*Connarus*

*pinnatus* Cavan.



Chlorophyll



## CURIGITALY.

## TAB. XXVI.



*Urugi-Tali*; apud Bramannes *Tali dau Kennapa*; Lusitanos *Crica davelha Trapadeira*; Belgas *Groot Klimmend Hondepint*. *Taly* species est, nascens in arenosis præsertim in *Angiecaimal*. Radix fibrosa, profunde se demittens, cortex nigricans & maxime rubicundus. Cauliculi lignosi cortice fusco ex radice prodeuntes hinc inde in nodulos protuberant. Folia ex furculis lateralibus bina proveniunt, tertiumque in vertice emittunt, oblongo rotunda, cuspidata, in superficie glabra, texturâ densiori, ex viridi fusca. Costa media in utraque parte eminens, nervos aliquot annulari ductu producit. Flores in petiolis tenuibus plures congregatim conveniunt, penta vel hexapetali, oblongo rotundi, cuspidati, candidi, odoris expertes. Stamina in medio plura, tenuia, parva, albicantia, apices crassiores ac ex flavo albicantes habent. Fructus oblongo rotundi, nonnihil incurvi, & in parte convexa futura striati, primum virides, ex in rubescentes; unicum semen in flaviori membrana continent, oblongum, planum, convexum. ex cinereo fusco rubescens. Succus foliorum cum lacte ebutyrato, & chalybeato, hæmorroidibus medetur: Fructus in febribus malignis, ad sedandos ardentissimos calores adhibentur.

## TAB. XXV. &amp; XXVI.

Fructuum formam si spectes pro specie *Perim-  
Curigil* part. V I. pag. 43. Tab. 24. descriptum  
haberi possunt, quamvis in aliis partibus mul-  
tum differant. Semina autem quæ in vesiculis  
sunt magna ex parte conveniunt, dactylum refe-  
rentia quamvis non ita dura.











*Dāda-vāra* Lat.

മാടവാര Mal.

يَعْقَاقِيَّةٌ وَغَرَّةٌ Arab.

वाले Bram.



*Morinda*

*umbellata* L.







## PÁDA-VÁRA.

## TAB. XXVII.



Rutex quem Malabarenſes *Páda-Vára*; Bra-  
mannes *Rana-Vali* & *Macadapola*; Luſitani  
*Fruita Macanda*; Belgæ *Macande* vocant;  
ſpecies, vel ipſa *Cadapilava* parva; *part. I.*  
deſcripta, eſt. *Radices* ex tuberculis ſupra  
terra repentes, hinc inde prodeunt, fibro-  
ſæ, cortice croceo. *Stipes* ad altitudinem quatuordecim  
pedum exſurgit, brachii craſſitiem habens, cortice cine-  
reo. *Caules* nodulati ſunt ac rotundi, teneriores ex cine-  
reo virides, vetuſtiores plane cinerei, viridem corticem  
tegentes. *Folia* bina tranſverſim erumpunt, oblongo  
rotunda, anguſta, cuſpidata, ſolida, denſa, glabra, ſa-  
poris ſubdulcis, ſed diutius maſticata, linguam parumper  
lancinantia. *Coſta* media ab utraque parte eminens, plures  
minores obliquo annuleo ductu emittit. *Flores* in ſum-  
mitate furculorum ſupra originem foliorum, quatuor  
ex uno nodulo, quinque petiolis erumpunt, ac in ſingulo  
petiolo, quinque, ſex, ſeptemve numero proveniunt,  
ſuntque parvæ, gemmæ ſine calice, tetrapetalæ, exterius  
viridi dilutæ, interne longis ac candidis pilis in totum ob-  
ſitæ. *Stamina* in medio quatuor brevia, tenuia, cum api-  
cibus albicantibus. Stylus craſſior, viridis, in medio emi-  
net, ex capitulo plano, viridi, quod primordium fructus,  
originem ducens. *Fructus* qui ſex, ſeptemve congregatim  
in ſummitate caulium conſpiciuntur, baccæ ſunt plano  
rotundo, ex flavo, ubi ad maturitatem pervenire, ru-  
beſcentes, exterius in cortice ſex ſeptemve cancellis no-  
tatae, ex quorum ſingulis ocellus ſubflavus extuberat;  
Caro




*Caro* intus densa, flava ac humidior, saporis dulcis, linguam supra folia, lancinans, numerosa ossicula ex flavo albicantia, plana oblonga & angusta in se habet, putamina duriori, nucleo albicante. Succus expressus & haustus intestinorum tormina tollit. Nascitur circa *Parue* & in aliis locis; fructus mense Januario maturi.

## T A B. X X V I I.

Error est quod planta hæc species *Cada-Pilava* | latius videre est in annotationibus ibi adjec-  
sit, quoniam nulla inter illas convenientia, prout | tis.









Unita Lat.  
20310 229 Mas.  
Benedicti  
Bram.  
وَنُحْمُ وَأَلَجُ Arab.





Fig. 1.




Fig. 2.



## U N J A L A.

## T A B. X X V I I I.




Alabarensium *Unjala* vel *Unbala*; à Braman-  
nibus *Bendarli*; à Lusitanis *Fruita Tanão*; à  
Belgis *Duimkruid* vocatur; frutex est nas-  
cens in terris *Betimene*, *Calgolano* & alibi,  
semper virens, florens tempore pluviali;  
frugens mense Octobri & Novembri. *Folia*  
in pedunculis, ex viridi flavescentibus, trina, quaterna,  
imo quina proveniunt, oblonga, crassa, rigida, in cus-  
pidem contracta. *Flores* in summitate ramorum race-  
matim spectantur, quini, seni & plures, brevibus insi-  
dentes petiolis; gemmæ rotundæ sunt & virides, plani,  
capitulo albicante instructi, pentapetalæ, cuspidatæ, in-  
terius carne viridi, transversim dissectæ, stellam referunt,  
saporis subacris & aromatici. *Fructus* floribus succedentes,  
ex rotundo plani sunt & compressi, cortice crassiori &  
duriori ex viridi flavescente; unicum tantum semen,  
planum, rotundum ac albicans, continent, in cujus  
meditullio pellicula rotunda, tenuis, albicans & trans-  
parens; saporis subamari. Vires adhucdum incognitæ.



Albatrossum Capla vel Capla; a stratis  
nibus Bandura; albatrossus Penna Lando;  
Belgis Bunkum vocatur; fructus ei mal-  
cus in terra Penna; Capla & albi  
lempet vrens; flores ei ore pho-  
traces medie Octobris & Novembri. A  
in pedunculis; ex viridi flavo centibus; tunc, dactylis  
inque quibus proveniunt; oblonga; etiam, rigida; in  
pida in contracta. Aere in humore tamotum fac-  
mari in speculantur; quum, tunc & plures, brevius in-  
dentes petiolo; gemmae totius inque vides; pluri-  
capitulo albiditate infulsit; pericarpia; enpacta; in-  
terius carne viridi; transverberis distincta; florum retropo-  
labore tubacis & arotatit. Aere in humore in  
ex rotundo plani sunt & compressi; cortice crasso &  
duriori ex viridi flavescens; in humore in  
placuit; rotundum; aculeis; coarctat; in capis  
mediculis petiolo rotunda; tunc, alba & tunc  
patens; apertis tubacis. Aere in humore in












Jiti-Canni Lat.  
ഇഴിമരക്കു Mal.

رطب قنطريون Arab.

*Loranthus*

*loniceroides. L.*







## I T T I - C A N N I.

## T A B. X X I X.



**R**utex *Itti-Canni*; apud Bramannes *Medecanni*; Lusitanos *Fula Morisca*; Belgas *Prikhout*; ramos habet quadrangulares, geniculis hinc inde interstinctos, coloris cinerei. *Folia* ex geniculis ramorum, petiolis longis, crassioribus, interius planis provenientia, oblongo rotunda sunt, textura crassiori coriacea, nonnihil rigida, fragilia, fracta gratum odorem spirant, saporis subamari. *Flores* ad exortum foliorum plures congregati in uno petiolo visuntur, flavi, pentapetali, oblongo & flavo collo, intus subtilissima flava lanugine; ex cujus orificio plura staminula emicant, flava, tenuia, sine apicibus, quorum aliqua in vertice bifida. *Gemmæ* florum oblongæ, ex una parte nonnihil inflexæ, vertice obtusiori, coloris flavi. Foliis florum marcescentibus ex ipsa florum basi *fructus* nascuntur, rotundi, globosi, in vertice in angustum se stringentes, coloris ex viridi flavi; in medio cavitas est, nucleum rotundum, album ac parvum, saporis amari in se continens. Nascitur supra arbores æque ac *Maravaras*, continuo radices emittens in corticibus arborum, nunquam in terra; semper virens, & flores vel fructus habens; natale solum circa *Cochien* & in multis aliis est locis, in densis nemoribus & proceris arboribus. Radicis cortex dentes figit.

## T A B. X X I X.

Species *Caprifolii* vel *Perichlymenii* hic frutex est.



ITICANNA

T A B. X I X.

Rutex Indica; apud Brunnos Alia  
canam Indicas Fals. Males Belas  
rarios habet quadrangulatos, geniculis  
inde interstinctos, coloris cinerei. Folia ex  
geniculis ramorum, petiolo longis  
horibus, interius plane procreantia, op  
longo torunda sunt, textus cristatus, comas, non  
nisi rigide, fragilis, fructu etiam odoratum, huius  
apertis subman, lower ad extremum, huiusmodi  
giganti in uno petiole videntur, huius, perispermatis, ob  
longo & flavo collo, interius tubulosis, huius, lanugine  
ex cuius orificio plura filamenta emittunt, huius, tenuia  
sunt apertis, quorum aliquid in vasis distat, quorum  
florum oblongos, ex una parte necesse est huius, vertice  
obtusum, columellam, 1 obliquis, huiusmodi, huius  
it is florum, huius, huius, huius, huius, huius, huius  
verice in sequentibus, huius, huius, huius, huius, huius  
in medio cavata, huius, huius, huius, huius, huius  
vini, huius, huius, huius, huius, huius, huius  
re, huius, huius, huius, huius, huius, huius  
huius, huius, huius, huius, huius, huius  
flora vel fructus, huius, huius, huius, huius, huius  
nihil aliud, huius, huius, huius, huius, huius  
rione, huius, huius, huius, huius, huius







Handwritten text in Urdu script, likely a signature or a short note, positioned below the sketch of the palm tree.

نیکوئی کے لئے  
آپ کا





*Firi-Jtti-Lanni* Lat.

ဝါးသစ်စုစု Mal.

چھریا بھری قانی Arab.



*Polhos*



*pentandra*







## TIRI-ITTICANNI.

TAB. XXX.




*Iri-Itti-Canni* Malabarenfium; Bramannum *Satayo*; Lufitanorum *Fula da Naira*; Belgarum *Smiltbout*; planta est in corticibus crassiorum & vetustiorum arborum initium fumens, sicut *Itti Canni* & omnes species *Maravara*. Rami cortice cinereo ac crassis nodulis hinc inde extuberant, circa nodos spinis geminatis, acutis & ex adverfo oppositis muniti. Folia in pedunculis brevioribus, crassis emergentia, oblonga sunt, textura crassiori, spissa ac solida. Flores in communibus petiolis, oblongis solitarii, bini, ternive ex nodulis ramorum spicatum erumpunt, seriatim dispositi, pentapetali, coloris aurancei. Stamina in illis conspicua quinque brevissima, apicibus albicantibus dotata. Gemmae rotundae eundem ut flores colorem referunt. Fructus nulli, nec vires.



In-lin-Cum Malabaricum; Brasiliense;  
Sesuvium; Liliacearum Folia de Yana; Bel-  
gium; Zamboni; planta est in corticibus  
crassiorum & vultuorum arborum in  
lunata, sicut in Cum & omnes ipse  
Mala. Rami cortice cinereo ac  
nodulis hinc inde exuberant, circa nodos folia  
nata, acuta & exadverso oppositis sunt. Folia in  
cuneis brevioribus, crassis emarginatis, oblonga sunt  
textura crassior, foliis ac subd. Folia in communibus  
petiolis, oblongis foliis, bini, ternive ex nodulis  
motum spicam erumpunt, tetram diplois, pentape-  
tal, coloris variet. Liliace, in illis conspicua quibus  
provilina, apicibus albis dactylis. Gemmae rotundas  
candem ut flores colorem retinet. Folia nulli, nec  
vires.












*Kari-Vilandi* Lat.  
කරිවිලන්දි Mal.  
فَخَارِي وَيَلَانْدِي Arab.

*Smilax*

*China. L.*







## CARIVILLANDI.

## TAB. XXXI.



*Ari-Villandi*; Bramannes *Carapu* dicunt; Lusitani *Raiz da Boba*; Belgæ *Pokhout*; nascitur in planis & arenosis locis inter *Calicolangen* & *Cranganoor*, & per totam *Malabariam*, floret tempore pluviali, frugens mense Novembri & Decembri, semper virens.

*Radix* crassa, lignosa, dura, hinc inde fibras tenues lignosas ac rigidas spargit, coloris terreo fusci. *Rami* tenues, nodosi, duris, acutis, viridibus, ac inferiora versus incurvatis spinis instructi, hinc inde capreolos ejiciunt. *Folia* in furculis ac pedunculis brevioribus, crassis, viridibus, interius fulcatis proveniunt, oblongo rotunda, anterius brevi cuspide, rigida, texturâ fragili, viroris in recta parte fusci & nitentis, in adversa dilutioris, odoris nullius, saporis subastringentis. *Costæ* in adversa parte eminent, subtilioribus ac transversis venulis intertextæ. *Flores* hinc inde in furculis foliosis, fasciati conspiciuntur, nodulum ceu capitulum petioli in vertice pedunculis brevioribus & incurvis circumfidentes, hecæ petali, quorum tres interiores valde angusti & stricti, exteriores non item, sed in medio venula striati, decussatim interpositi; in medio *stamina* eminent viridia, sex albis ac inflexis apicibus instructa; nullum odorem habent. Post flores sequuntur *fructus* parvi, circa capitulum petioli, fasciatim dispositi, subrotundi & nonnihil oblongi, vertice parum stricto, primò virides, dein subnigri, intra corticem unicum tantum semen continentes, saporis expers. *Radix* cephalica cum *Gingibere* & *Curcuma*, panno oleo *Sergalini* tincto inspersa, per modum suffimigii capitis dolores mitigat; cum *Glyrrhirrisa*, cortice *Caniram* & succo *Tamarindorum*, loco balnei adhibita, idem præstat, ut & in oleo cocta & capiti inuncta vel auribus immissa. Concretus radicis



dicis bulbus cum Curcuma tritus & in oleo fergalini coctus, catharrorum fluxum impedit; cum gingibere vel pipere, oleo foliorum de Emferno, vel melle intinctus eundem habet effectum. Loco vero Salsaparillo Peruviano à Lusitanis usurpatur.

## T A B. X X X I.


Smilax hæc aspera nostri Auctoris, pro specie Zalsaparillo habetur, ac ejus loco apud Malabareses optimo cum successu in usu est, sicut & omnia genera *Smilacis Aspera*, in illo tertio conveniunt. Secundum relationem plerorumque Botanicorum: hujus plantæ diversæ inveniuntur species; vide *Rechium Hist. Plant. Mexic. lib. 8. Cap. 41. Piso in sua Historia Natur. Bras. lib. 4. cap. 65.*

duas species enumerat sub titulo *Ivapecanga*, quæ non malè cum *Macapatli-Paralta Rechii* convenit, & huic *Cari Villandi* quam maximè assimilatur, exceptò quod capreolis careat secundum notam characteristicam doctissimi *Raji* in *Hist. Plant. lib. 13. p. 2. cap. 3.* quorsum Lectorem nostrum removemus.



WAT.
















## W A T T O U - V A L L I.

T A B. X X X I I.




Alabarenfium *Wattou-Valli*, à Bramannibus *Maroi*; à Lufitanis *Torique*; à Belgis *Penshout* vocatur. *Caules* rotundi funt, virides ac glabri. *Folia* in petiolis oblongis, craffioribus, interius fulcatis proveniunt, mollia, lenia, viroris pleni, faporis fubamari, odoris gravioris. *Flores* fafciaati erumpunt in communi petiolo, pentapetali, viroris ex flavo diluti, interius punctulis nigricantibus adfperfi; in meditullio globulus confpici-  
tur, capitulo viridi inftitutus, quinque angularis, viridi vena ftriatus, quinque foliolis parvis, rigidis, viridi dilutis ftipatus, odoris fubgravis; nafcitur circa urbem *Cochin*, floret tempore pluviali; femper virens. *Fructus* raro inveniuntur. *Radix* funiculofa eft longe lateque fe dif-  
pergens, faporis amari. *Folia* cum cortice *Lanjæ* con-  
trita ulcera inveterata exficcant: Cortex cum Sandalo & Muliebri lacte in formam noduli adhibitus, præftantiffi-  
mum Caufonis remedium eft.











*Tsjageri-Niren* Lat.

ചകേരിച്ചുറുക്കി Mal.

*Carandi*

कासादी Bram.

جياقهرى نوزيم Arab.



*Dioscorea*

*triphylla* L.







## T J A G E R I - N U R E N .


T A B . X X X I I I .

**T** Jageri-Nuren Malabarenfes; Carandi Br-  
mannes; Grabosa Lufitani; Keylen Belgæ:  
dicunt, frutex eft, cujus radix ut rapha-  
ni Hispanici; Caules tenues, rotundi, gla-  
bri, spinofi, perinde ut Nuren-Kelengu. Folia  
in petiolis oblongis, terna proveniunt,  
interiori parte viridi fusca & furda, adversâ glabra ac ni-  
tentia, costulis albicantibus, quæ in adverfa parte eminent,  
obsita. Flores fert nullos. Fructus plures congregati  
spectantur in petiolis oblongis, ad exortum foliorum  
erumpentes, ad longitudinem pollicis, triangulares, in  
vertice cuspidem ferentes, virides & cinerea lanugine  
amicti, ad petiolum converfi; singuli anguli duos vesicu-  
las feminales continent, cartilaginoso sepimento sejuncti,  
in quibus unum vel duo reperiuntur semina oblongo ro-  
tunda, plana, subrubra, sepimento accumbentia, tenui  
membrana instructa. Præter fructus, verrucas ceu spu-  
rios habet fructus, oblongos, scabros ad pedem foliorum  
quasi oppositos, è quibus perinde ac è radice & semine  
nova planta exsurgit. Natale solum est Corate & alia loca,  
semper virens & frugens. Folia millepedum morsui me-  
dentur. Radix cocta pro balneo usurpata vel potu assum-  
ta hæmorrohides sanat.













*Katu-Naren-Kelengü Lat.*

കാട്ടുകുമ്പളകിഴക്കി *Mul.*

قحاطو نورهم تحمرهغيا *Arab.*

*Dioscorea*

*pentaphylla L.*





*Handwritten text, likely a name or description, written in a cursive script.*

*Handwritten text, likely a name or description, written in a cursive script.*

*Handwritten text, likely a name or description, written in a cursive script.*



## KATU-NUREN-KELENGU.

T A B. X X X I V.



*K* *Atu-Nuren-Kelengu*; apud Bramannes *Dava-Karandi*; Lusitanos *Grabosa rodonda*; Belgas *Keylen met ronde wratten*; species *Katu*, ceu *Nuren Kelengu*; nascitur in petrosis terræ *Candanate & Cotate*; *Radix* magna & crassa instar *Bryoniæ*; *Caules* spinosi. *Folia* sena, quina, quaterna vel trina in uno petiolo. Præter verrucas bulbosas, intus carne densa, aquea, viscida repletas, quæ caulibus circa exortum foliorum insident, nullos habet fructus, semper novas propagines antequam terram attingant, ejicientes. Ignoti usus.


R

No.











Niren - Keléngu Lat.

നൂറുകിടങ്ങു Mal.

نورق خالانجو Arab.


कोनेट Bram.



Dioscorea

pentaphylla. L.







## N U R E M - K E L E N G U.

T A B. X X X V.




Rutex, qui Malabarenfibus *Nurem-Kelengu*; Bramannibus *Connetti* & *Tilo Carandi*; Lusitanis *Grabosa Ovada*; Belgis *Ey-Keylen* dicitur. *Radix* ut *Katu-Nuren-Kelengu*, sed major. *Caules* spinosi ac tenues. *Folia* ex petiolis, intus striatis quina proveniunt, minora quam præcedentia, texturâ tenui, plana, glabra. *Costa* media plures tranversales emittit, nervulis instructæ, adversam foliorum partem cancellatim pertexentes. *Flores* ut *Kattu-Kelengu*, in vertice fructuum pentapetali, coloris flavi, dein nigricantes, qui umbilicum fructus constituunt; & *Fructus*, sed minores; præter illos & alii visuntur, plures simul provenientes, virides, oblongi, triangulati, in unoquoque angulo faba valde plana & compressa. Est & alia species *Nuren Kelengu* cum priori conveniens, præter quod folia tantum trina prodeant, & fructus oblongo angustiores sint. Nascitur in terris *Angecaimael* & ubique locorum, semper viret, floret, fruget & verrucas habet, inter edulia recensetur; in medicina nullius usus.











Kātu-Katojil Lar.

കാട്ടുകാട് Mal.

Karendi

काण्दि Bram.


خايط قاجيل Arab.



*Dioscorea*

*bulbifera. L.*







## KATU-KATSJIL.

TAB. XXXVI.



*Atu Katsjil*; Bramannibus *Karendi*; Lusitanis *Grabosa* & *Fruita Barruga*; Belgis *Munniks Keylen*; species est *Tsjagari Nuren*, respectu radicis, fructuum, & verrucarum, quæ & totam producant plantam. *Caules* tennes, nonnihil lignosi, se invicem sinuose amplectentes. *Folia* petiolis longis, angulatis & interius fulcatis, ad exortum nonnihil extuberantibus, insident, oblonga, mollia, lenia, tenuia, ex uno latere longius exprorecta, lato sinu ad petiolum profunde incisa. *Costa* media, quatuor alias annulari ductu emittit, in adversa parte eminentes. *Flores* nulli. *Fructus* plures congregatim proveniunt, triangulares, angulis late extensis ac valde extenuatis, in unoquoque duo reperiuntur semina in se invicem decumbentia, sine ullo intersepto, rotunda, plena, lata ac tenui rotunda pellicula circumcincta, primum viridia deinde ad spadiceum vergentia. Præter hosce etiam fructus habet spurios, cauliculis supra exortum foliorum insidentes, ut in *Kátu Kelengu*, spadiceos, cortice scabro, carne densa, circa corticem viridi, intus albicante: humor nonnihil viscidus. Nascitur in densis nemoribus circa *Candanata* & *Oedampere* & alibi. Fructus mense Septembri maturescunt, semper virens. Radicis decoctum cum pulvere radicum *Chinæ* ulcera mundificat & sanat.




KATUKATZIL

TAB. XXXVI

Am. Kattil; Brannanibus Kattil; 1. Kattil;  
Grabsa & Fritia Baraga; Belgis & 1. Kattil;  
Kattil; species est 1. Kattil; 1. Kattil;  
radicis, fructuum, & verborum, 1. Kattil;  
& totam producant plantam. 1. Kattil;  
vires, nonnulli lignosi, se invicem hinc inde  
amplexantes. Folia petiolis longis, angulatis & incisis  
filicis, ad exortum nonnulli exuberantibus, in latere  
oblonga, molli, tenuia, ex uno latere longius  
explicata, lato sinu ad petiolum proinde inclina-  
ta, quatuor alias annulis ductu emittit, in adven-  
tibus circumnantes. Folia nulli. Folia plures con-  
tinent, triangulata, angulis late exortis ad  
valde exortibus, in quodamque duo respondent totum  
in latere circumnantes, sine ulla interposito, totum  
clausa, late ac tenui rotunda petioli circumnantes, tri-  
angula varia deinde ad petiolum vergentia. Præter hoc  
cetera fructus habet spinosus, carnalis supra exortum  
totum in latere, ut in Asia Kattil, radices cortice  
scabro, crasso densa, circa corticem vincta, inter alios  
te: fructus nonnulli videtur. 1. Kattil in densitate  
1. Kattil & 1. Kattil & 1. Kattil. 1. Kattil in  
1. Kattil in latere, 1. Kattil in latere, 1. Kattil in  
1. Kattil in latere, 1. Kattil in latere, 1. Kattil in









Kattu-Kelengü Lat.

കാട്ടുകുളങ്ങര Mal.

قَطَّ قَالِ الْغُجُو Arab.

Carando

काचदो Bram.



Dioscorea

aculeata. L.



Handwritten text in Arabic script, possibly a title or heading, located in the upper center of the page.

Handwritten text in Arabic script, possibly a date or a reference number, located below the main heading.





## K A T T U - K E L A N G U.

## T A B. X X X V I I.



Alabarensium *Kattu-Kelangu*; Bramannum *Carando*; Lusitanorum *Fruita burruca penachofo*; Belgarum *Pluymkeylen*, species est *Nuren Kelengu* vel *Kalangu*. *Radix* major & crassior est exterius ex spadiceo nigricans, hinc inde tenues emittens fibras, intus carne albicante, subflava, densa, humida, nonnihil unctuosa & laxis filamentis pertexta, saporis aquei, odoris nullius, longæva ac semper de novo furculos emittens. *Caules* tenues, rotundi, duris acutisque spinis hinc inde obsiti, geniculati, inferius nigricantes. *Folia* instar cordis humani, ad petiolum profunde incisa, plana sunt, glabra, lenia, mollia. Cum *costa* media utrinque tres transversales, ductu valde obliquo, excurrunt, venis transversis, in adversa parte nonnihil extuberantes concomitatae. *Flores* plures in petiolis brevioribus supra exortum foliorum spicati oriuntur, suntque gemmulae parvae, nullum fructum dantes. Cum hisce simul proveniunt *Fructus* rotundiusculi, irregulares, triplo vel quadruplo grandiores quam *Nuren Kelengu*, cortice tenui & subamaro, intus carne densa, solida, humida, unctuosa, subflava, saporis aquei, nullum semen habent; semper viret, florens mense Julio & sequentibus. Nascitur circa *Cochien* & in multis aliis locis. Fructus à plebe comeduntur. Radix cum *Croco* mixta & apposita crurum tumores dissipat; succus foliorum cum urina vaccæ dolores aurium sistit.









Handwritten text in the left margin, likely a label or description, written in a cursive script. The text is partially obscured and difficult to decipher, but appears to include the word "Pencil" and some other illegible characters.





Katsjil-Kelengü Sav.

31 2 33 mal.

Koni

كوتل Bram.

قحاجيل قمارينغي Arab.

*Dioscorea*

*alata*. L.



1917



## K A T S J I K E L E N G U.

## T A B. XXXVIII.



*Atsji Kelengu.* *Caules* habet quadratos, virides, angulatos, alatos, crispatos, ac in alarum ora nonnihil rubescentes, geniculis interstructos, intus lignosos. *Folia* in geniculis geminata & ordine decussato in pedunculis oblongis quadrilateratis proveniunt, oblonga, lato sinu excisa, mollia, lenia, viroris in recta parte saturi. *Costa* media utrinque tres laterales emittit alatas, candicantes & nitentes, venulis transversis subrubescens intertextas. *Flores* nulli. *Fructus* cortice spadiceo, interius sanguineo rubri, carne densa, albicante, viscida, caulibus ad exortum foliorum insident, suntque velut radices, quæ folia ut & novellos foliorum caules emittunt, & radículas ceu fibras albicantes, ubi terræ incumbunt, fundentes. Foliorum succus scorpionum morfui medetur. Radicis pulvis cum *Catu-Panna-Kelengu*, ulceribus malignis summo cum successu inspergitur; fots loco adhibiti idem præstant.


T A B. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII.

Frutices hi species sunt *Batati* sylvestris, à ne- | A°. 1686 ex Ceylone transmissi. Radices ibi-  
mine unquam, quod sciam, descripti; omnes | dem à porcis & aliis animalibus comeduntur.  
in Horto Medico Amstelodamensi inveniuntur, |












*Fruta - taly Lat.*

എരിയ പഴം *Mal.*

حَمْرِيَا طُعْلِي *Arab*





شاهنشاہ



## ERIMA-TALI.


## TAB. XXXIX.

**M** Alabarenfium *Erima-Tali*; Bramannum *Dou Parvati*; Lusitanorum *Raix da solteira* est; Belgæ vocant *Kreefthout*. *Radix* longe lateque se circa terræ superficiem dispergit. *Caulis* rotundi sunt, tortuosi, cinerei, muscosi, spadicei. *Folia* pedunculis brevioribus, interius striatis, ex viridi flavescentibus & muscosis erumpunt, oblongo rotunda, texturâ crassa, spissa, solida. *Costa* media in adversa parte eminens plures subtiliores venas, in adversâ parte extuberantes producit; nec odorem, nec saporem habent. *Flores* in oblongis petiolis, plures congregatim & racematim conspiciuntur duplices, pentapetali, interiores primò candidi & nitentes, dein cum nitore flavescentes. Exteriores ex ruffo rubescentes, incisi, in medio plicâ striati; in orificio apices candidi, lati, foliosi, cuspidati emicant, in meditullio globulus stellatus, quinque cuspidibus inter apices interpositi, videtur; qui primordium fructus est; odoris gratissimi. *Florum* *Gemnæ* rotundæ, spadiceæ, villosæ, infra villosam tunicam virides; ex quibus hiantibus, capitulum spadiceum se exserit, instar serici fulgens; *Fructus* muscosi, oblongo rotundi, in quorum medio globulus oblongus, ex viridi albicans, continetur. Nascitur circa *Cranganoor*, *Mangatti* & aliis in locis, florens tempore pluviali. Succus expressus cum oleo Nucis Indicæ & pulvere Cumini coctus, ulcera *pinis* mitigat & sanat.











*Ana-párua* Lax.

എറുപുല Mal.

عنق يخرق Arab.

वेदरुति Bram.




*Pothos*

*scandens* L.



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the age of the paper. Some words are difficult to decipher but appear to include "The", "of", and "to".





## A N A - P A R V A.

## T A B. X L.



*Na-Párva*; apud Bramannes *Benderli*; Lusitanos *Tolhas da lanca*; Belgas *Prangmortel*, pro secunda specie *Tinda-parva* habetur, cujus descriptio *Tomo primo* videri potest. *Radices* fibrosæ ex caulibus inferioribus, super terram repentibus hinc inde proveniunt. *Caulēs* rotundi virides, clavículas, quibus se arboribus affigunt, emittentes. *Folia* quæ caulibus & furculis insident, velut ex duobus foliis difformibus, conformata sunt; quorum inferiora loco petioli; superiora oblongo rotunda, in cuspidem contracta, venulis obliquo & arcuato ductu versus cuspidem striata; inferiora oblongo-angusta, antè ubi foliis superioribus annexa, nonnihil dilatata, ac in longum venis striata, texturâ solida, superficie plana, glabra, viroris communis, saporis subamari & subastringentis. *Flores* nulli. *Fructus* hinc inde in caulibus & furculis ex origine foliorum, petiolis incurvis, brevibus, crassiusculis ex rubicundo fuscis proveniunt; capitula oblongo rotunda, paralellis lineis se mutuo intersecantia, striata, pluribus parvis gemmulis extuberantibus, è quibus minuti cuspides emicant, interstincti; colore primum albicante, dein viridescente; ultimò rubro corallino ac parum nitente: infra fructus in petiolo unicum & quidem minutum conspicitur folium, rotundum ex rubicundo-obscurum, versus exteriora reflexum, interiora contractum, quo fructus tener & albicans, ab una parte obtegatur. *Semina* in fructibus numerosa, velut semina piscium continentur, coloris subflavi, viridi diluti.



diluti. Locus nativitatis est *Chanotti*, *Parou* & alia loca; semel quotannis fruetur tempore pluvioso. Vires eadem cum *Tinda-Parva*. In febribus ardentibus & malignis adhibetur.


## T A B. X L.

In prima parte hujus horti pag. 88, *Ana Parva* ut species *Tinda Parva*, mentio facta fuit; quæ hic plenissime describitur. Verum, | toto cælo à se invicem differunt, quamvis nomine pœnè convenient, id quod pluribus in locis in hoc opere videtur, & annotatum est.



T S F A N.








*Tjangelam Parenda Lat.*

جَلَمَ فَرْد Arab.









## TSJANGELAM-PARENDA.

## TAB. XLI.



*Sjangelam-Parenda*; à Bramannibus *Mana*; à Lusitanis *Babosa Quinado*; à Belgis *Quylklim* nuncupatur. *Caulis* quadrangulati, angulis acutis, ac lateribus planis, quorum duo adversa latiora sunt, geniculati, cortice viridi fusco & glabro, intus carnosus, carne humida, densa & viscosa, minimè lignosi, ex geniculis claviculas emittentes. *Folia*, quæ in geniculis caulium proveniunt, lata, antè strictiora & obtusa ora, acutis subtilibusque cuspidibus eminentia, texturâ crassa, spissa, mollia, superficie leni & glabra, viridis in utraque parte saturi, ast in adversa fuscioris. *Costa* media duos emittit laterales, in recta & adversa parte eminentes, & plures minores diffundentes. *Rami* ex geniculis dependent, in furculos plures ramosos se divaricantes; ex viridi fusci, rotundi, intus aquei & virides; ficcati materiam nigerriam atramenti & carbonum instar in se continent. *Flores* parvi sunt, ut & *semina*. Nascitur circa *Coylen* & *Tuëvantoor*, fructet tempore pluviali. *Folia* contrita aurium fuligines mundant; succus cum Cardamomo, Coriandro ac Gingibere sumtus, intestinorum flatus discutit.

## TAB. XLI.


Planta hæc inter species repentes *Sedi* numeranda est.

TA-












Pu - Walli Lat.

පු ධ වු ලු Mal.

يُحُو وَاللِي Arab.



Pothos

Drupacea.



Handwritten text in Arabic script, possibly a title or heading.

Handwritten text in Arabic script, possibly a date or reference.

Handwritten text in Arabic script, possibly a signature or note.





## T A B. X L I I.




Rutex *Pu-Valli*, à Bramannibus *Pallay*; à Lusitanis *Salique da Serre*; à Belgis *Slagblom* vocatur. *Rami* cortice cinereo, ligno albicante. *Folia* in petiolis brevioribus solitaria proveniunt, oblongo rotunda, anterieus cuspidata, texturâ crassa ac solida, superficie Plana & glabra, viroris in recta parte viridis & nitentis, in adversa furdi; odoris nullius, saporis valde acidi. *Costa* media, in adversa parte extuberans, obscura tractu venas emittit, folium intus fubeunt. *Flores* in communibus ac brevioribus petiolis plures hinc inde congregati videntur, suntque gemmæ parvæ, quibus apertis, tetrapetali sunt, obtuse cuspidati, nullius odoris. *Stamina* in iis quatuor cum suis apicibus. *Fructus* baccæ parvæ rotundæ, coloris sub ruffi, spiculo tenui & nigricante in vertice instructæ, carne intus succulenta ac dulci; in medio *ossiculum* est valde durum & albicans, in illo unum, duo & sæpius tria semina inveniuntur, dura, glabra, coloris ex ruffo-fusci ac nitentis. Natale solum est *Catour*, *Petravide* & alia loca; floret mense Januario. Nullius in medicina usus.












*Du-pal-valli* Lav.

തു പാല വള്ളി Mal.

جُو پَعْلُ وَالِي Arab.









## P U - P A L - V A L L I.

## T A B. X L I I I.



*Upal-Valli* ; Bramannicè *Pallay* ; Lusitanicè *Fula da Mel* ; Belgicè *Koey-mortel*. *Rami* spadiceo muscosi, ligno duro, cortice lacteo. *Folia* in pedunculis brevioribus, spadiceis, gemina, decussato ordine proveniunt, oblongo rotunda, antèrius cuspidata, viroris in recta parte saturi, adversà clari. *Flores* racemati, in petiolis ex spadiceo rubescentibus, tenuibus, rotundis, qui supra exortum foliorum emicant, visuntur, pentapetali, parvi, candidi, interius lanuginosis pilis obsiti, in medio expunctati, circa orificium subvirescentes. *Calix* arctus, viridis, circa basim primordium fructus continens. *Fructus* globuli lanuginosi, cinerei, exterius spiculis acutis, quibus vestibis adhærent, obsiti; (*Lappas* nostratum esse diceret) *semen* in se continent unum, figurâ ovali, glabrum, durum, nigrum, admodum nitens. Globuli aperti odoris sunt suavis & mellei. Nascitur post *Calnolan* & aliis in locis, præsertim arenosis & petrosis. Floret tempore pluvii, semper virens. Vires adhucdum incognitæ.


## T A B. X L I I I.

Plantæ hujus semen magnam habet similitudinem cum *Alcea Carpinifolio*, semine rostrato.














*Acatoja-valli* Lat.

ആകടാവാലി Mal.

*Acatoja-valli*


आकारवालि Bram.

عجوة الج Arab.

*Caosytha*

*filiformis* L.








## ACATSJA-VALLI

ceu

## MUDILATALI.

## TAB. XLIV.



*Catsja-Valli*; Bramannes dicunt *Medica-Tali*; Lusitani *Ramos dasevi*; Nostrates *Meervlechtwortel*. *Cauliculi* rotundi, tortuosi, valde tenues, lenti, super plantas lato tractu excurrentes, ramosque quos arripiunt ita adherentes & obsidentes ut visum ac accessum impediunt. *Folia* in tenerioribus viridibus cauliculis rara ac sparsa, valde parva, ex viridi flavescentia, plura simul juncta insident. *Flores* in viridibus, rotundis, nonnihil tortuosis ac striatis petiolis, congregati seu spicati videntur, ad exortum brevibus foliolis succincti; hextapetali sunt, albicantes, quorum tres exteriores lati & cuspidati, interiores superne bicuspidati, odoris nullius. In medio *stylus* crassior, oblongus, cuspidatus; *stamina* sex quæ stylum interiorem in se complectuntur. *Fructus* baccæ rotundæ, primum virides, exin albicantes, umbilico latiori, sex foliolis coronatis primò viridibus, post nigricantibus, sub tunica crassa exteriori globulum continentes; ossiculum in se continent rotundum, cortice tenuissimo, viridi, post nigricante, intus nucleo albo repletum: Natale solum est *Cochien* & multa alia loca; densa amat nemora. Integra planta cum gingibere exsiccatò, & *Nirvala-Pullu* tosta, pulverisata & butyro mixta, inveterata ulcera mundificat. Cum oleo *Sergalin* capiti illita capillorum radices firmat; cum cortice *Arekeræ* & *Tsjangelam-Parendi*, tosta, pulverisata & *Opio* mixta capitis ulceribus medetur; cum Cardamomo, lacte & oleo *Sergelim* ad liquidam consistentiam




tiam redacta, capitis æstus tollit. Succus cum saccharo oculorum ardorem & suffusionem amovet; per se loco balnei adhibitus hemicraniam mitigat.

## T A B. XLIV.

Species hæc est Cuscutæ, crescens supra arbores & plantas.









*Kareta-Isjori-valli* Lat.

കരതാജിജി Mal.

കരതാജി Bram.

قُرَّحَا جِيَّ وَاللِّي Arab.




*Cissus*

*trilobata*



St. John's - 1843

St. John's - 1843





## KĀRETA-TSĴORI-VĀLLI.

T A B. X L V.



*āreta-Tsĵori-Vālli*; linguā Bramannum Dou-  
*Cerberi-Valli*; Lusitanorum *Uvas de Boy*;  
 Belgarum *Wild Pimperlingen*. *Cauliculi* ex unā  
 parte ex fusco rubescunt. *Folia* numero  
 tres, in petiolis ex adverso claviculorum  
 sitis proveniunt, oblongo rotunda, cuspi-  
 data, medium majus est, lateralia minora, texturā  
 crassa, densa, viroris in recta parte fusci & nitentis. *Tsĵori-*  
*Valli* folia esse diceret, maximè enim cum illis conve-  
 niunt, sed oblongiora sunt, nec ferrata, ast in oris apici-  
 bus, quæ costularum transversarum sunt productiones,  
 eminentia. *Flores* racemati in pedunculis viridibus & pa-  
 rum nitentibus proveniunt; tetrapetali, interius coch-  
 leato-cavi, ex viridi albescentes, exterius rubescentes.  
*Stamina* habent quatuor, flavis apicibus nodulata: in me-  
 dio *stylus* viridis, crassior ac depressus sese erigit. *Fructus*  
*uvæ* rotundæ, in medio vertex est, qui maturis fructibus  
 decedit; in principio virides, post rubescentes, maturi  
 nigricantes, carne intus viridi succulenta, lancinante, quæ  
 officulum grandius rotundum ex rubro nigricans comple-  
 ctitur, cujus nucleus candidus. *Sylvæ Trigolin, Catati* &  
 alia loca pro natali solo habentur, semper frugens vel flo-  
 rens. *Folia* siccata, pulverisata, zingibere sicco, vetusto  
 pipere & saccharo commixta asthmaticis profunt.


T A B. X L V.

Summo jure planta hæc *Hedera Trifolia Baccifera* | omnes notæ characteristicæ conveniant.  
*Malabarensis* dici posset; mirum enim quantum |












*Módira-válli* Lat.

മോദിരവല്ലി Mal.

ماديرا والي Arab.









## MODIR A-VALLI.

## TAB. XLVI.



*Odira-Valli*; apud Bramannes *Caro-Crodi*; Lusitanos *Barba-Castilhana*; Belgas *Knevelklim*. *Rami*, teneriores virides, cortice spadiceo fuscescente, ligno albicante. *Folia* in furculis transversis, spinis lignosis muniti, plura in arctis intervallis congregata proveniunt, longa, cuspidē angustā eminentia, texturā crassa, spissa, ac solida, superficie plana & glabra, viroris in recta parte nitentis, in adversa dilutioris; *Costa* media in adversa parte eminet, & plures tenuiores transversim emittit; tota hæc planta ad summam magnitudinem excrescit, arboribus se affigens atque illas circumvolvens. Nascitur circa *Atingen*, *Cota*, *Recare* & alia loca, arenosa amans; semper viret, sed flores nec fructus habet, ut & nullum in medicina usum.




THE PARABLE OF THE TARES

Matthew 23: 24-38

At that time Jesus said unto the people, Be ye also ready, for ye know not the day of the Lord's coming. As it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man. For as in those days, Noah was eating and drinking, and men were marrying and giving in marriage, and the flood came and took them away all, except them that were left upon the ark; so shall it be also in the days of the Son of Man. The Son of Man shall find the sons of men sleeping. Then shall he come and shall find some sleeping, and shall find some watching. Be ye therefore ready, for ye know not the day of the Lord's coming.









*Valli-Modagam Lat.*

വളി മോദകം Mal.

وَالِي مُدَاغَامُ Arab.






Page 17

Shah Waliullah

1111


1111





## VALLI-MODAGAM.

## TAB. XLVII.

 Rutex qui Malabarensibus *Válli-Módagam*; Bramannibus *Carotha-Tali*; Lusitanis *Folha da Pao*; Belgis *Oorblad* dicitur. Rami virides, geniculati, ligno albicante, medullâ ruffâ. Folia in geniculis geminata in pedunculis crassis sed brevioribus visuntur; ampla, oblonga, texturâ admodum crassa, carnosâ, coriacea, superficie plana, glabra; viroris in recta parte nitentis, in adversa surdi. Costa media in adversa parte alte extuberat, in dorsum acutum desinens, tenuiter etiam in recta emiens, ex qua nervi annulares, obscuro tractu excurrunt. Flores ac fructus habet nullos. Nascitur circa *Parakaro*, *Mangatti*, & in aliis locis, semper virens. Cortex radicis cum cortice limonum in pulverem redactus, ulceribus, quæ Malabaribus *Tsjeu-Barapén* vocantur, cum successu perlinitur.

## TAB. XLVI. &amp; XLVII.


Folia harum hæderarum, optimè cum illa *Bela-Modagam* conveniunt.

ME-











*Veriam-pulli* Lat.  
 നെന്മിളംപുള Mal.  
*Basil*  
 साडी Bram.  
 نَهْرِيَامْ بُورِي Arab.




*Ingenhoussia*

*umbellata.*



Handwritten text in a cursive script, likely a signature or a short letter. The text is faint and difficult to decipher, but appears to be written in a single hand. It includes several lines of text, possibly a name and a date or location.





## MERIAM-PULLI.

TAB. XLVIII.




*Eriam-Pulli*; à Bramannibus *Basil*; à Lusitanis *Folbal-Aredilba*; à Belgis *Smindelblad* vocatur; frutex est repens supra terram. *Caules* habet virides, glabros geniculatos intus aqueos & fragiles. *Folia* distinctis intervallis, in petiolis oblongis proveniunt, claviculis hinc inde comitata, oblonga, cuspidata, texturâ spissa, superficie glabra & lenia, viroris vividi & nitentis, circa ora rubescencia & apicibus cuspidatis munita; sapor acidus est & linguam vellicans, odor subgravis. *Costam* mediam albicantem, in adversa parte extuberantem, duæ laterales concomitantur, multis raris venulis interspersæ. *Flores* umbellati in petiolis, quia exortum foliorum è geniculis erumpunt, visuntur, tetra vel pentapetali, ex viridi albicantes. In medio *capitulum* habent planum & rotundum cum suo stylo rosaceo. *Stamina* quatuor sunt vel quinque, pro numero petalorum, albicantia, flavis apicibus instructa. *Florum Gemmæ* oblongæ, ex rubro-purpureæ & viridescentes. *Fructus* baccæ rotundæ fasciatim pendentes, glabræ, ex viridi rubræ; caro mollis, valde succulenta, ex viridi fusca, saporis subacidi, odoris gravis, ut folia *Mandaru*. *Officulum* quod continet, valde durum est, nonnihil rotundum, ex viridi-fuscum; nucleus albus. Nascitur circa *Warapoli* & in aliis locis, florens & frugens ad finem anni. Ex foliis balneum antiparaliticum conficitur. Eorundem & *Nelicæ* succus ophtalmiam tollit.



Faint, mostly illegible text in a single column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be a Latin description or list of items.









*Pada-kelangu. seu.*  
*Muscheqa-pada. seu.* } *Lat.*  
*Padavalli*

പാദവല്ലി *Mal.*

يَقْفُوعٌ فِي الْأَنْغُورِ *Arab.*

पाडावेली *Bram.*



*Menispermum*


*peltatum. L.*



1844

John C. Smith  
of the County of  
Columbia State of  
Virginia

do hereby certify  
that the within  
is a true and  
correct copy





## PADAVALLI;

ceu

PADAKELENGU.

TAB. XLIX.



Rutex *Páda-Vállí*; aut *Páda-Kelengu*; qui lingua Bramannum *Páda-Vállí*, & *Muts-jega Pada*; Lusitanorum *Raiz de Camara* dicitur; à Belgis *Stoelmortel* vocatur. Radix longa, crassa, fibris terræ affixa; cortex fuscus est & amarus. *Caules* tenues, lignosi, virides, pilosi. *Folia* in pilosis & ad originem extuberantibus petiolis proveniunt, oblonga, triangularia, ad exortum latiora, in cuspidem unius duorumve pollicum extensa, texturâ densa & crassiuscula, superficie interiori scabra & subaspera, viroris communis, exteriori leni, admodum villosa, viroris vividi. *Costa* media plures alias emittit, in adversa parte eminentes. *Flores* admodum minuti, albicantes, racematim supra ex origine foliorum producuntur. *Fructus* in racemis, acini sunt minores, primò oblongo-rotundi & parum compressi, dein rotundiores; *coloris* in principio viridi-diluti & minutis pilis obducti, postea candidi & nitentis, saporis subamari & parum pungentis; singuli acini ossiculum habent rotundum, planum, bilaterale, in unoquoque latere tribus ordinibus denticulorum minutorum obsitum; *ossicula* primum flava, postea fusca sine ullo nitore *Paloerti*, *Cochien* & alia loca, pro natali solo agnoscit, floret mense Augusto, Septembri & Octobri; fructus circa finem anni ad maturitatem perducuntur, semper viret. Radix cum lacte è butyrato & semine Cuminum sumpta disenteriae & hæmorrhoidibus inservit; cum aqua calida flatus discutit. Succus foliorum expressus rubedinem oculorum solvit, & capitis dolores mitigat.

TAB. XLIX.


Species est Bryoniae levis Malabariensis.

KAP.



\_\_\_\_\_







*Kappá-kelengú* Lat.

കപ്പ കേളം Mal.

*Cananga*

कनगा Bram.

قنطرة غاب Arab.



*Convolvulus*

*Batatas* L.



W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.

W. J. B. B. C. O. U. S.



## KAPPA-KELENGU

ceii

BATATAS.

TAB. L.



*Appa-Kelengu* ; Bramannicè *Cananga* ; Lusitanicè *Batatas* ; Belgicè *Pattates* , *Radix* multum fibrosa , magna , crassa , carne intus carnosâ , aquea , cortice sanguineo-rubro. *Caules* rotundi , virides , pilosi , asperi , intus aquei , cum filamento lignoso albicante. *Folia* in petiolis oblongis , rotundis , viridibus , fulcatis , pilosis , subasperis videntur , radiculis ad ortum stipata , cuspidata , circa basim angulatim excisa , tenuia , mollia , lenia , glabra , colore viridi saturo in recta , in adversa parte claro , sapore aqueo subdulci. *Costa* media duas laterales obliquè spargit , è quibus aliæ exeunt , ad oras arctuatim inflexæ , in adversa parte eminentes. Excolitur hæc planta in hortis & agris , radix enim culinaria est ut *Pastinacæ* nostratum , grata ac dulcis ; in medicina nullius usus.


TAB. L.

Planta hæc est *Camotes* Hispanorum Clusii , *tica* describitur.  
*Bauh. Pin.* & à *Pisone* sub nomine *Brasiliano* *Ge-*













*Podava kelengú* Lat.  
 പൊടവ കേളണ്ടു Mal.

*Karódi*


കാരോടി Bram.

أَفْخَاوَا قَهْرِيخَا Arab.


*Dioscorea*

*hispida.*











*Podava kelengú* Lav.

പൊടവകുളങ്ങര Mal.

*Karódi*

कोन्दि Bram.

باضاؤ قلا Arab.



*Dioscorea*

*hispida.*





Handwritten text, possibly a label or description, located in the upper left corner of the page. The text is faint and appears to be written in a cursive or script style. It includes several lines of text, some of which are partially obscured by the sketch. The text is written in a language that appears to be Arabic or Persian, based on the script.



## PÓDAVA-KELÉNGU.

TAB. LI. LII.



*Pódava Kelengu*; secundum Bramannes *Karodi*; Lusitanos *Raiz da Bolsa*; Belgicè *Beursmortel*. *Radix* ex pluribus crassis, ruffis, oblongis, spadiceo dilutis bulbis constat varicosis, quibus minores adjuncti sunt, carne intus albicante densa, linguam acriter vellicante. *Caules* rotundi, tortuosi, nodulati, spinis acutis, rigidis, cuspidatis, rubescentibus, transversis obsiti, versus interiora nonnihil reflexi, ex parte virides, ex parte rubescentes, cæruleo rore tincti. *Folia* in petiolis crassis, spinosis, viri dilutis, striatis, circa nodulos caulium extuberant, terna, oblonga, antè cuspide longiori eminentia, viridi satura, pilosa lanugine vestita, ad tactum parum hirsuta. *Flores* in petiolis oblongis, crassioribus, spinosis, viridi fuscis, supra exortum foliorum erumpunt, hepta vel octo petali, stellatim cuspidati, viridi diluti, flocculosa lanugine obsiti, superne oblongis & tenuibus filamentis cuspidati, ac oblongis pilis barbati, odoris expertes, ut & fructuum. *Candanata*, *Warapoli* & alia loca pro natali solo agnoscit, florens tempore pluvioso. Folia cum *Coriandro* in aqua decocta præsentaneum pro algida febris sunt remedium.


TAB. LI. LII.

*Pódava-Kelengu* est *Rapum* Brasilicanum seu A- | dicit Piso lib. 4. Cap. 64. Apud Lusitanos sub  
mericanum alterum *Bauh. Pin. lib. 3. sect. 1. Cara* | nomine *Ihnama* venit.











*Panamboe*  
*Pamboe-valli* Lat.

പമ്പോ വളി mal.

بَيَانَبُؤُ وَالْبَنِي Arab.



*Flagellaria*

*indica. L.*



د. ۱۰۰



## PANAMBU-VALLI.

## TAB. LIII.



*Anambu-Valli*; à Bramannibus *Silona*; à Lusitanis *Ratao Falso*; vocatur; à Belgis *Wilde Rotting*. *Radix* nodosa, albicans, tenui corticula ruffa obducta, quæ fibras longas tegit & crassas, ex albo sub flavas; *Oculi* ad latera novos edunt caules, saporis sub aquei. *Ipsi* *Caules* rotundi, glabri ex viridi fusci, parum lignosi. *Folia* arundinacea, oblongo augusta, in cuspidiem oblongum valde crispofum & intortum stricta, venis in longum striata, viror fuscus est & nitens, fuscior cum vetustiora sunt; *Mendoni* foliis prorsus similia, sed hæc parum fusciora. *Flores* in fastigiis cauliculorum racematim visuntur, primò albicantes, exin virescentes, petali rotundiores sunt, parum cuspidati, circa se mutuo convoluti: *Stylus* crassior, oblongus, viridis, qui germen fructus est, ex vertice tria oblonga alba foliola ejiciens; *Stamina* sex tenuissima, candida, oblongis, crassis, subflavis apicibus dotata; odor gratus. *Fructus* in cacumine caulium racematim pendent, suntque baccæ rotundæ, spiculum & cum illo folia sex in vertice gerentes, primum virides, post rubicundi; caro intus vix ullius momenti, nonnihil succulenta, saporis subsalsi; officulum unicum in se continens, grandius, rotundum, nucleo albicante instructum. Nascitur circa *Cranganoor*, *Parou* & alia loca, plerumque vel florens vel frugens. Vires apud Medicos ignotæ.


## TAB. LIII.

Multæ species *Rotang* in India inveniuntur; potest; *Banh. Pin.* ascendens enim arundo est. hæc pro genere *Arundinis Indica* Volubulis haberi











*Pripú* Lat.

دود Mal.

پیزیو<sup>و</sup> Arab.




*Tetracera*

*sarmentosa* Vahl.



1844

Philip James  
1844  
1844





## P I R I P U.

## T A B. L I V.




Rutex *Piripu*; apud Bramannes *Ogoranim*; Lusitanos *Erva Bendita*; Belgas *Peylkruid*. *Caules* rotundi, geniculati, internodiis foliis vestiti. *Folia* ex geniculis caulium proveniunt, in pedunculis ab interiori parte planis, oblongo rotunda sunt, cuspidata, circa oram crispata & leniter crenata, mollia, lenia, viridis in recta parte saturi; odoris nullius, saporis adstringentis. *Costa* media in tergo eminet. *Flores* umbellati videntur in geniculis caulium ad exortum foliorum, pentapetali, oblongo rotundi, candidi, quinque staminibus albicantibus instructi, quæ cæruleis apicibus donata. Odor nullus. *Florum Gemmæ* oblongæ, antea strictiores, candidæ, nitentes. *Fructus* gemmulæ sunt seminales, conicæ, valde duræ, coloris cinereo fusci; duo in illis semina, parva, rotunda, dura, nigra. Colitur circa *Pananie*, *Ainacoti* & in aliis locis; floret mense Decembri, multum æstimatus. Succus pro balneo præparatur contra herpetem & impetiginem. Radix alexipharmaca est, præsertim in aqua *Oryzæ* decocta, trita, & umbilico illita.













*Isjeria-pupal-valli* Lat.

മലിമ മലിമ Mal.

*Van-valla-valli*

വടക്കാരി Bram.

قحوپعل والي Arab.

*Jasminum*

*pubescens* W. & A.




Thema: ...

...

...

...

...





## TSJERIA-PU-PAL-VALLI.

T A B. L V.




*Sjeria-pu-pal-Valli*; Bramannes dicunt *Vanualla-Valli*; Lusitani *Fula Leitica*; nostrates *Sparling*. *Caules* corticem habent teneriorem, spadiceo-dilutum, muscosum ac villosum. *Folia* bina in nodulis ramorum erumpunt, oblongo rotunda, anterieus cuspidata, texturâ crassa, spissa, solida, superficie lenia & glabra; viridis in recta parte nitentis, in adversa levioris, pilis sparsim obsita. *Flores* racemati in summitate furculorum spectantur, pentapetali, oblongi, cuspidati, stelliformiter expansi, exteriori parte candidi, interiori circa unam oram albicantes, circa aliam ex albo dilute rubescences, lactei, odoris grati. *Stylus* in medio conicus, cuspidatus, quinque lignosis oblongis apicibus constans. *Fructus* fert nullos. Natale solum *Warapoli* est, arenosa amans ac semper florens. *Folia* cum sandalo citrino & cumino in aqua macerata & melli permixta, febres ex articulari morbo ortas, tollit.











Tālu-dāma Lat.

കുളുദാ Mal.

Punár-navá

पुनरनवा Bram.

طَعْرُوْةُ Arab.



Boerhaavia

diffusa. L.



Handwritten text, possibly a signature or date, in a cursive script. The text is faint and difficult to decipher, but appears to be written in the upper center of the page.





## TÁLU-DÁMA.

## TAB. LVI.




*álu-Dama*; Bramannicè *Punarnava*; Lusitanicè *Folhas do Pitao*; Belgicè *Tras Wortel*. *Caules* rotundi, rubescentes, geniculati, nodosi. *Folia* rotundiora, crassa, ab una parte viridia, ab alia viridi clara; circa costas plicis striata, circa oram rubescentia. *Flosculi* supra exortum foliorum exstant, cyathi formes, persico rubri, in oris leviter crenati, in orificio interiori, purpurei. *Stylus* rubro purpureus, rubra gemmula dotatus. *Stamina* itidem purpureo rubra flavis, gemmis nodulata. *Gemmæ* seminales, oblongo rotundæ, costulis quinque eminentes ac pilosæ; semen in illis unicum, oblongum. *Montan* nativitatis locus est, floret tempore pluvioso, arenosa amans & petrosa. Decoctum hujus plantæ, febres ex endemio morbo ortos, quem indigenæ *Pitáo* vocant, tollit: *Radici* cortex cum cumino & sero lactis pro potu adhibitas alvum laxat.

MEN.



Malabaricus, Plantarum Indiarum; I. Ind.  
nec. Plantarum Indiarum; I. Ind.  
rotundi, tuberosi, nodosi.  
Folia rotunda, crassa, adnata, tri-  
loba, ad alas vixi ciliis; ciliis corollae filis  
fimbriae ciliis ornatae. Flores rubri.  
exsertis foliorum etiam, ciliis fimbriae, petalis rubris.  
in ore fovea creta, in ore interiori, putrescente, vixi  
rubro putrescente, rubra gemmula dotata, etiam fimbria  
putrescente rubra fovea gemmula dotata. Gemmae fimbriae  
oblongo rotundae, costulis quinque eminentes ac pilosae;  
fimbria in illis unicum, oblongum. Mentum nativitas  
locus est, flos tempore pluvioso, areola annua & po-  
tola. Decorem huius plantae, folios ex tendentem  
modo ortos, quem indigenae Pura vocant tollit. Rura  
cortex cum cumino & loto lactis pro tota adhibetur et  
vum laxat.









*Mendonii* Lat.

മെന്റോനിയ Mal.

*Vagá-balsacó*


वागायपको Bram.

مهذفاني Arab.

*Gloriosa*

*superba. L.*







## M E N D O N I.

## T A B. L V I I.



*Endoni*; à Bramannibus *Arty*; à Lusitanis *Raiz d'empose*; à Belgis *Croes steen* vocatur. *Radix* in duo finditur brachia, longitudinem spithamæ adæquantia, nonnihil plana, unum tamen majus altero, cuticula tenui ruffa vestita; caro densa, albicans, subflava est. *Caulis* è radice exsurgit unus, hinc inde tres quatuorve cauliculos simul emittens, virides, tenues, ipse rigidus, minus durus, viridis, medulla aquea, filamentis lignosis per-texta. *Folia* ad cymas cauliculorum prodeunt, oblongo angusta, in cuspidem acutissimum desinentia, venis densis instructa; instar foliorum arundinis, striata, costulâ in adversa parte extuberante instructa, viroris communis ac vividi, saporis adstringentis. *Flores* in petiolis propriis proveniunt, rotundis, longis, surrectis, viridibus, hec-  
petali, oblongo angusti, cuspidati, vermiculatim in oris crispatis, in adversam partem inflexi, texturâ densi, exterius costula eminente instructi; coloris sunt speciosi, primò in totum ferme dilutè viridescentes, solo cuspidè rubore aliquo perfuso, dein viroris inferius dilutioris, superius obscurè rubescentes, post inferius flavescentes, superius colore miniato venusto tincti, quo demum etiam inferiori parte suffunduntur. *Stylus* in medio viridi-fuscus, oblongus, crassus, surrectus, trilateralis; in vertice *stamen* est unicum oblongum, trilaterale, in singulis lateribus sulco striatum, superne in tres cuspides divisum, circa basin sex staminibus longioribus comitatum, quæ primum viridi diluta, ex in flavescentia, post rubescentia, perinde ac in floribus vidimus, in cuspidè lingulas habent transversas, nonnihil nutantes, latas, planas, virides, duobus limbis flavis circa oras obducta, flavo farinaceo rore conspersi. *Florum Gemmae* coniceæ, ceu pyramidales; ob-




quinque costulas eminentes, quinque angulares esse dices, viroris fusci. Floribus deciduis remanet stylus, oblongas viridi fuscas constituens capsulas feminales, quæ ad digiti longitudinem excrescunt, trilaterales, laxo cortice in tres oblongos loculos divisas. Seminibus maturis se relaxant, interius futura striati, quæ tandem etiam præficcitate solvitur. *Semina* duplici serie in hisce loculis inveniuntur, rotunda, primò albicantia, dein rubra & nitentia. Nascitur circa *Cochien* & in aliis locis; sed propter floris venustatem etiam in hortis excolitur, plerumque pene florens. Indigenæ isti radicis parti, quæ ad Boream vergit, magnam vim adscribunt in sympathia, magia, & aliis Metaphysicis operationibus. Fructus alioquin radici adnatus luxuriantem ulcerum carnem impedit; cum oleo *Sergelim* & haustus & pudendis applicatus hujus pulvis, partum facit facilem.

## T A B. L V I I.

Planta hæc ex Ceylon transmissa est sub nomine *Niaughala*, & anno precedenti 1686, in horto Nobillissimi ac Clarissimi Domini *Gasparis Fagel*, floruit. Doctissimus D<sup>o</sup>: *Paulus Hermans*, in celeberrima Leydensium Academensi Botanices Professor, nominat *Lilium superbum Ceylanicum*.

VEET.







*Veetla-caitú* Lat.  
 വെറ്റിലക്കടലിട Mal.  
 وحيطية قحطية Arab.  
*Narlagondo*  
 नारलगंडो Bram.



*Tradescantia*

*cristata* L.



1850  
J. P. ...  
...  
...  
...





## V E E T L A - C A I T U.

T A B. LVIII.




*Eetla-Caitu* ; apud Bramannes *Narla Gondo* ; Lusitanos *Marchato* ; Belgas *Himpblad*. *Radix* fibrosa, tenuis, albicans. *Caules* in nodulos seu geniculos divisi, rotundi, virides, rubescentes, pilosi, venosi, è nodulis cauliculos ejicientes. *Folia* quæ caules in nodis investiant, oblongo rotunda, inferius lata, antè in cuspidem desinentia, viridis in recta parte fusci, in adversa non item, in ea tamen costa eminet, nullius saporis. *Flores* simul in cacumine caulium proveniunt, parvi, cærulei, hexta petali, quorum tres oblongo rotundi, interius concavi, ex petiolo transversim exeuntes. *Stamina* habent sex, flava, quorum duo apicibus cæruleis, reliqui subflavis dotati sunt; stylus in illorum medio emicat, viridi dilutus, globulo instructus. Post flores *Gemmæ seminales* oblongæ visuntur, trilaterales & rotundæ; in unoquoque latere in longum striatæ, primò albicantes & nitentes, exin flavescentes. *Semina* continent sex, duo intra singula, in longum jacentia, parva, oblonga, in principio viridia, tum candida, tandem ex rubro fusca; saporis nullius. Natale solum est *Cochien* & alia loca, semper virens & per terram rependo cum flore & fructibus, ulterius se extendens. Medici usum ignorant.

P O X.














*Dongolam* Lat.

മെളിമല Mal.

بهنجی الہ Arab.







## P O N G O L A M.

## T A B. L I X.



*P*ongolam; Bramannes dicunt *Sammāna*; Lusitani *Raiz da Mostarda*; Belgæ *Kerswortel*. Rami cinerei. Folia viridia sunt, oblongo angusta, cuspidata, in oris acutis denticulis crenata, rigida, plana, glabra, viroris fusci; præter costam mediam nervulos habent transversos, annulatim in se invicem incurrentes; saporis ejusdem ut *Tblaspi* alterum, ceu *Raphanus* major; belgæ dicunt *Myredik*. Floret nec fruet. Circa *Mangatti* invenitur, & in paucis aliis locis, arenosa amans. Usus hujus plantæ in medicina magnus est, calefacit enim, exsiccat, discutit omnia vitia ex frigore orta, ut & humores pituitosos ac febres.










# I N D E X.

*Prior numerus Tabulam, posterior paginam indicat.*

A.		P.	
	Catsja-Valli, seu Mudila Tali. 44-83	<b>P</b>	Ada-Valli vel Pada Kelengu. 49-93
	Amolago. 16-31		Pada-Vara. 27-51
	Ana-Pärva. 44-83		Panambu-Valli. 53-99
			Pee-Amerdu. 19. 20-37
			Pee-Ula. 23-43
			Piripu. 54-101
			Podava-Kelengu. 51. 52-97
			Pongolam. 58-109
			Pu-Pal-Valli. 43-81
			Pu-Valli. 42-79
B.		S.	
<b>B</b>	Afella. 24-45	<b>S</b>	Chembra-Valli. 6-11
	Batta-Valli, vel Natsjam Crua. 1-1		Scheru-Valli-Caniram, vel
	Beetla-Codi. 15-29		Sjerou-Valli-Kansjeram. 4-7
	Belurra-Tsjori-Valli. 10-19		Scheru-Katu-Valli, Caniram, vel;
			Tsjeru-Katu-Valli-Kansjeram. 5-9
			Schunambu-Valli. 11-21
C.		T.	
<b>C</b>	Ari-Villandi. 31-59	<b>T</b>	Alu-Dama. 56-105
	Cattu-Molago. 13-25		Tjageri-Nurem. 33-63
	Cattu-Tirpali. 14-27		Tjori-Valli. 9-17
	Cit-Amerdu. 21-39		Tiri-Itti-Canni. 30-57
	Curigi-Taly. 26-49		Tsjangelam-Parenda. 41-77
	Curinil, vel Curignil. 25-47		Tsjera-Pu-Pal-Valli. 55-103
			Tsjereu-Caniram, vel
			Tsjerou-Cansjeram. 2-3
E.		U.	
<b>E</b>	Rima-Taly. 39-73	<b>U</b>	La. 22-41
			Unjala. 28-53
I.		V.	
<b>I</b>	Itti-Canni. 29-55	<b>V</b>	Alli-Caniram. 3-5
			Valli-Kara. 18-35
			Valli-Modagam. 47-89
			Vallia-Pira-Pitica. 7-13
			Vallia-Tsjori-Valli. 8-15
			Veetla-Caitu. 58-109
K.		W.	
<b>K</b>	Appa-Kelengu, vel Batatas. 50-95	<b>W</b>	Artou-Valli. 32-61
	Kareta-Tsjori-Valli. 45-85		
	Katsji-Kelengu. 38-71		
	Kattu-Katsjil. 36-69		
	Kattu-Kelangu. 37-71		
	Katu-Kara-Walli. 17-33		
	Katu-Nuren-Kelengu. 34-63		
M.			
<b>M</b>	Endoni. 57-107		
	Meriam-Pulli. 48-91		
	Modira-Valli. 46-87		
	Molago-Codi. 12-23		
N.			
<b>N</b>	Atsjam-Crua, vel Batta-Valli, 1-1		
	Nurem-Kelengu. 35-67		



INDEX

Præfixum indicat, posterior paginam indicat.

19-23	P	P. 19-23
27-31	P	P. 27-31
33-39	P	P. 33-39
41-47	P	P. 41-47
49-55	P	P. 49-55
57-63	P	P. 57-63
65-71	P	P. 65-71
73-79	P	P. 73-79
81-87	P	P. 81-87
89-95	P	P. 89-95
97-103	P	P. 97-103
105-111	P	P. 105-111
113-119	P	P. 113-119
121-127	P	P. 121-127
129-135	P	P. 129-135
137-143	P	P. 137-143
145-151	P	P. 145-151
153-159	P	P. 153-159
161-167	P	P. 161-167
169-175	P	P. 169-175
177-183	P	P. 177-183
185-191	P	P. 185-191
193-199	P	P. 193-199
201-207	P	P. 201-207
209-215	P	P. 209-215
217-223	P	P. 217-223
225-231	P	P. 225-231
233-239	P	P. 233-239
241-247	P	P. 241-247
249-255	P	P. 249-255
257-263	P	P. 257-263
265-271	P	P. 265-271
273-279	P	P. 273-279
281-287	P	P. 281-287
289-295	P	P. 289-295
297-303	P	P. 297-303
305-311	P	P. 305-311
313-319	P	P. 313-319
321-327	P	P. 321-327
329-335	P	P. 329-335
337-343	P	P. 337-343
345-351	P	P. 345-351
353-359	P	P. 353-359
361-367	P	P. 361-367
369-375	P	P. 369-375
377-383	P	P. 377-383
385-391	P	P. 385-391
393-399	P	P. 393-399
401-407	P	P. 401-407
409-415	P	P. 409-415
417-423	P	P. 417-423
425-431	P	P. 425-431
433-439	P	P. 433-439
441-447	P	P. 441-447
449-455	P	P. 449-455
457-463	P	P. 457-463
465-471	P	P. 465-471
473-479	P	P. 473-479
481-487	P	P. 481-487
489-495	P	P. 489-495
497-503	P	P. 497-503
505-511	P	P. 505-511
513-519	P	P. 513-519
521-527	P	P. 521-527
529-535	P	P. 529-535
537-543	P	P. 537-543
545-551	P	P. 545-551
553-559	P	P. 553-559
561-567	P	P. 561-567
569-575	P	P. 569-575
577-583	P	P. 577-583
585-591	P	P. 585-591
593-599	P	P. 593-599
601-607	P	P. 601-607
609-615	P	P. 609-615
617-623	P	P. 617-623
625-631	P	P. 625-631
633-639	P	P. 633-639
641-647	P	P. 641-647
649-655	P	P. 649-655
657-663	P	P. 657-663
665-671	P	P. 665-671
673-679	P	P. 673-679
681-687	P	P. 681-687
689-695	P	P. 689-695
697-703	P	P. 697-703
705-711	P	P. 705-711
713-719	P	P. 713-719
721-727	P	P. 721-727
729-735	P	P. 729-735
737-743	P	P. 737-743
745-751	P	P. 745-751
753-759	P	P. 753-759
761-767	P	P. 761-767
769-775	P	P. 769-775
777-783	P	P. 777-783
785-791	P	P. 785-791
793-799	P	P. 793-799
801-807	P	P. 801-807
809-815	P	P. 809-815
817-823	P	P. 817-823
825-831	P	P. 825-831
833-839	P	P. 833-839
841-847	P	P. 841-847
849-855	P	P. 849-855
857-863	P	P. 857-863
865-871	P	P. 865-871
873-879	P	P. 873-879
881-887	P	P. 881-887
889-895	P	P. 889-895
897-903	P	P. 897-903
905-911	P	P. 905-911
913-919	P	P. 913-919
921-927	P	P. 921-927
929-935	P	P. 929-935
937-943	P	P. 937-943
945-951	P	P. 945-951
953-959	P	P. 953-959
961-967	P	P. 961-967
969-975	P	P. 969-975
977-983	P	P. 977-983
985-991	P	P. 985-991
993-999	P	P. 993-999
1001-1007	P	P. 1001-1007
1009-1015	P	P. 1009-1015
1017-1023	P	P. 1017-1023
1025-1031	P	P. 1025-1031
1033-1039	P	P. 1033-1039
1041-1047	P	P. 1041-1047
1049-1055	P	P. 1049-1055
1057-1063	P	P. 1057-1063
1065-1071	P	P. 1065-1071
1073-1079	P	P. 1073-1079
1081-1087	P	P. 1081-1087
1089-1095	P	P. 1089-1095
1097-1103	P	P. 1097-1103
1105-1111	P	P. 1105-1111
1113-1119	P	P. 1113-1119
1121-1127	P	P. 1121-1127
1129-1135	P	P. 1129-1135
1137-1143	P	P. 1137-1143
1145-1151	P	P. 1145-1151
1153-1159	P	P. 1153-1159
1161-1167	P	P. 1161-1167
1169-1175	P	P. 1169-1175
1177-1183	P	P. 1177-1183
1185-1191	P	P. 1185-1191
1193-1199	P	P. 1193-1199
1201-1207	P	P. 1201-1207
1209-1215	P	P. 1209-1215
1217-1223	P	P. 1217-1223
1225-1231	P	P. 1225-1231
1233-1239	P	P. 1233-1239
1241-1247	P	P. 1241-1247
1249-1255	P	P. 1249-1255
1257-1263	P	P. 1257-1263
1265-1271	P	P. 1265-1271
1273-1279	P	P. 1273-1279
1281-1287	P	P. 1281-1287
1289-1295	P	P. 1289-1295
1297-1303	P	P. 1297-1303
1305-1311	P	P. 1305-1311
1313-1319	P	P. 1313-1319
1321-1327	P	P. 1321-1327
1329-1335	P	P. 1329-1335
1337-1343	P	P. 1337-1343
1345-1351	P	P. 1345-1351
1353-1359	P	P. 1353-1359
1361-1367	P	P. 1361-1367
1369-1375	P	P. 1369-1375
1377-1383	P	P. 1377-1383
1385-1391	P	P. 1385-1391
1393-1399	P	P. 1393-1399
1401-1407	P	P. 1401-1407
1409-1415	P	P. 1409-1415
1417-1423	P	P. 1417-1423
1425-1431	P	P. 1425-1431
1433-1439	P	P. 1433-1439
1441-1447	P	P. 1441-1447
1449-1455	P	P. 1449-1455
1457-1463	P	P. 1457-1463
1465-1471	P	P. 1465-1471
1473-1479	P	P. 1473-1479
1481-1487	P	P. 1481-1487
1489-1495	P	P. 1489-1495
1497-1503	P	P. 1497-1503
1505-1511	P	P. 1505-1511
1513-1519	P	P. 1513-1519
1521-1527	P	P. 1521-1527
1529-1535	P	P. 1529-1535
1537-1543	P	P. 1537-1543
1545-1551	P	P. 1545-1551
1553-1559	P	P. 1553-1559
1561-1567	P	P. 1561-1567
1569-1575	P	P. 1569-1575
1577-1583	P	P. 1577-1583
1585-1591	P	P. 1585-1591
1593-1599	P	P. 1593-1599
1601-1607	P	P. 1601-1607
1609-1615	P	P. 1609-1615
1617-1623	P	P. 1617-1623
1625-1631	P	P. 1625-1631
1633-1639	P	P. 1633-1639
1641-1647	P	P. 1641-1647
1649-1655	P	P. 1649-1655
1657-1663	P	P. 1657-1663
1665-1671	P	P. 1665-1671
1673-1679	P	P. 1673-1679
1681-1687	P	P. 1681-1687
1689-1695	P	P. 1689-1695
1697-1703	P	P. 1697-1703
1705-1711	P	P. 1705-1711
1713-1719	P	P. 1713-1719
1721-1727	P	P. 1721-1727
1729-1735	P	P. 1729-1735
1737-1743	P	P. 1737-1743
1745-1751	P	P. 1745-1751
1753-1759	P	P. 1753-1759
1761-1767	P	P. 1761-1767
1769-1775	P	P. 1769-1775
1777-1783	P	P. 1777-1783
1785-1791	P	P. 1785-1791
1793-1799	P	P. 1793-1799
1801-1807	P	P. 1801-1807
1809-1815	P	P. 1809-1815
1817-1823	P	P. 1817-1823
1825-1831	P	P. 1825-1831
1833-1839	P	P. 1833-1839
1841-1847	P	P. 1841-1847
1849-1855	P	P. 1849-1855
1857-1863	P	P. 1857-1863
1865-1871	P	P. 1865-1871
1873-1879	P	P. 1873-1879
1881-1887	P	P. 1881-1887
1889-1895	P	P. 1889-1895
1897-1903	P	P. 1897-1903
1905-1911	P	P. 1905-1911
1913-1919	P	P. 1913-1919
1921-1927	P	P. 1921-1927
1929-1935	P	P. 1929-1935
1937-1943	P	P. 1937-1943
1945-1951	P	P. 1945-1951
1953-1959	P	P. 1953-1959
1961-1967	P	P. 1961-1967
1969-1975	P	P. 1969-1975
1977-1983	P	P. 1977-1983
1985-1991	P	P. 1985-1991
1993-1999	P	P. 1993-1999
2001-2007	P	P. 2001-2007
2009-2015	P	P. 2009-2015
2017-2023	P	P. 2017-2023
2025-2031	P	P. 2025-2031
2033-2039	P	P. 2033-2039
2041-2047	P	P. 2041-2047
2049-2055	P	P. 2049-2055
2057-2063	P	P. 2057-2063
2065-2071	P	P. 2065-2071
2073-2079	P	P. 2073-2079
2081-2087	P	P. 2081-2087
2089-2095	P	P. 2089-2095
2097-2103	P	P. 2097-2103
2105-2111	P	P. 2105-2111
2113-2119	P	P. 2113-2119
2121-2127	P	P. 2121-2127
2129-2135	P	P. 2129-2135
2137-2143	P	P. 2137-2143
2145-2151	P	P. 2145-2151
2153-2159	P	P. 2153-2159
2161-2167	P	P. 2161-2167
2169-2175	P	P. 2169-2175
2177-2183	P	P. 2177-2183
2185-2191	P	P. 2185-2191
2193-2199	P	P. 2193-2199
2201-2207	P	P. 2201-2207
2209-2215	P	P. 2209-2215
2217-2223	P	P. 2217-2223
2225-2231	P	P. 2225-2231
2233-2239	P	P. 2233-2239
2241-2247	P	P. 2241-2247
2249-2255	P	P. 2249-2255
2257-2263	P	P. 2257-2263
2265-2271	P	P. 2265-2271
2273-2279	P	P. 2273-2279
2281-2287	P	P. 2281-2287
2289-2295	P	P. 2289-2295
2297-2303	P	P. 2297-2303
2305-2311	P	P. 2305-2311
2313-2319	P	P. 2313-2319
2321-2327	P	P. 2321-2327
2329-2335	P	P. 2329-2335
2337-2343	P	P. 2337-2343
2345-2351	P	P. 2345-2351
2353-2359	P	P. 2353-2359
2361-2367	P	P. 2361-2367
2369-2375	P	P. 2369-2375
2377-2383	P	P. 2377-2383
2385-2391	P	P. 2385-2391
2393-2399	P	P. 2393-2399
2401-2407	P	P. 2401-2407
2409-2415	P	P. 2409-2415
2417-2423	P	P. 2417-2423
2425-2431	P	P. 2425-2431
2433-2439	P	P. 2433-2439
2441-2447	P	P. 2441-2447
2449-2455	P	P. 2449-2455
2457-2463	P	P. 2457-2463
2465-2471	P	P. 2465-2471
2473-2479	P	P. 2473-2479
2481-2487	P	P. 2481-2487
2489-2495	P	P. 2489-2495
2497-2503	P	P. 2497-2503
2505-2511	P	P. 2505-2511
2513-2519	P	P. 2513-2519
2521-2527	P	P. 2521-2527
2529-2535	P	P. 2529-2535
2537-2543	P	P. 2537-2543
2545-2551	P	P. 2545-2551
2553-2559	P	P. 2553-2559
2561-2567	P	P. 2561-2567
2569-2575	P	P. 2569-2575
2577-2583	P	P. 2577-2583
2585-2591	P	P. 2585-2591
2593-2599	P	P. 2593-2599
2601-2607	P	P. 2601-2607
2609-2615	P	P. 2609-2615
2617-2623	P	P. 2617-2623
2625-2631	P	P. 2625-2631
2633-2639	P	P. 2633-2639
2641-264		



H O R T I  
M A L A B A R I C I  
P A R S O C T A V A,

DE V A R I I G E N E R I S

H E R B I S  
P O M I F E R I S & L E G U M I N O S I S;

*Latinis, Malabaricis, Arabicis, Belgicis, Bramannum characteribus  
nominibusque expressis.*

Adjecta Florum, Fructuum, Seminumque nativæ magnitudinis vera  
delineatione, colorum viriumque accurata descriptione,

A D O R N A T A

*Per Nobilissimum ac Generosissimum D. D.*

HENRICUM VAN RHEDE TOT DRAKESTEIN,

*Toparcham in Mydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem, supremi Consessius apud  
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, nunc vero Equestris Ordinis nomine Illustribus  
ac Præpotentibus Provinciæ Ultrajectinæ Proceribus adscriptum,*

*Notis adauxit, & Commentariis illustravit*

J O H A N N E S C O M M E L I N U S

*In ordinem redegit, & latinitate donavit*

A B R A H A M U S à P O O T M. D.



A M S T E L Æ D A M I.

Sumptibus Viduæ JOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van  
DYCK, HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM,

Anno cld Idc Lxxxviii.



H O R T I  
M A L A R I A  
P A R S O C T A V A

H E R B I S  
P O M I F E R I S & L E G U M I N O S I S

H E N R I C U M A R H E D T O D R A K S T E I N

J O H A N N E S C O M M E L I N U S



H E N R I C U S A R H E D T O D R A K S T E I N  
J O H A N N E S C O M M E L I N U S



ILLUSTRI ac GENEROSISSIMO  
V I R O  
D. FRIDERICO ADRIANO

BARONIDE RHEEDE, LIBERO DOMINO DE REINS-  
WOUDE, EMMINCHAUSEN, BORNEWALL &c. ORDI-  
NIBUS EQUESTRIS DIGNITATIS TRAJECTINÆ DIO-  
CÆSEOS ADSCRIPTO.

**M**Eo jussu pervenit ad Te Tomus Octavus Horti  
Malabarici, testis perpetui Mei in te studii &  
amoris. Conjunxit nos quidem dudum sanguinis,  
unde genus uterque ducimus, necessitudo, &  
collegii societas, sed non minus me tibi devinxit tua  
virtus, elegantia & morum mirifica suavitas. Inter  
elegantiae, quam in omnis tua vita prae te fers, documenta cum  
politioris omnis doctrinae, cum hortorum culturae studium in primis  
elucet. Nam & in optimis & cultissimis scriptis legendis, ac  
quicquid in iis pulchrum & eximium invenitur memoriae mandandis;  
& in excolendis Hortis tuis, omnique florum & fructuum exquisito-  
rum genere conferendis Te totum esse & ipse novi, & omnes qui Te  
norunt, non ignorant. Persuasissimum itaque mihi est, non posse non  
gratum Tibi esse hoc munus, quod ab extremis Indorum oris Tibi  
mitto. Pasces enim oculos tuos spectaculo multarum mirarum, &  
Europæ adhuc invisitarum arborum, fruticum & herbarum, quas  
apud olim illas gentes collegi, ad quas nunc singulari quodam fato, cum  
typis Amsterodami hæc describuntur, & luci committuntur, publicæ  
rei causa cum imperio & magistratu extraordinario sum ablegatus. Tu  
velim sic existimes me ubique terrarum & gentium tui amorem alta  
mente conditum circumferre. Illum nulla temporis locorumque  
longinquitas delebit. Semper enim ero

Nobilissimo Nomini Tuo

Deditissimus

HENRICUS VAN RHEEDE.



# ABRAHAMUS à POOT M.D.

L. B. S. P.



Otavam cum hanc HORTI MALA-  
BARICI partem colligerem, ex authen-  
ticis non potui deprehendere, quin Auctor  
in Fruticum pergeret descriptione, ast cum  
ad Tabulam XXII. pervenissem, & reli-  
quas inspexissem, vidi me errasse, illum-  
que non jam de Fruticibus sed de Herbis agere, atque ideo  
pro *Frutex*, vel *Frutex qui*, legendum erit *Herba*, vel  
*Herba quæ*, hoc te B.L. scire volui & valere.



ABRAHAM'S BOOK

1845

1845





*Belá-schorá* Lat.

බෙලාසොරා Mal.

بلالچ جيار Arab.


பாலச்சி Gram.



*Cucurbita*

*lagenaria* L.







# PARS OCTAVA HORTI MALABARICI

DE VARIIS GENERIS

## HERBIS POMIFERIS & LEGUMINOSIS;

BELASCHORA.

TAB. I.



*S*chorà, variæ dantur species, *Belà-Schorà*, *Bilen-Schorà*, *Schakeri-Schorà*, *Caripà-Schorà*; *Belà-Schorà*; à Bramannibus, *Gara-Dudi*; Lusitanis, *Babora-Branca*; Belgis, *Witte Pe-poenen* vocantur. Radix intus filamentis, lignosis pertexta, corticem habet album.

*Caules* quadrangulati, profundè striati, inflexi, viridi diluti, pilosi, minus lignosi, succulenti, fistulosi, latum in medio habent tubulum. *Folia* unà cum claviculis, è cymis, pediculis longis, crassis, rotundis, tortuosis, viridi dilutis & pilosis proveniunt, magna, antèrius cuspidata, ad pediculum excisa, in margine hinc inde acuminata, minutissimis pilis obsita, lenia. instar *Veluti*, in recta parte viridi fusca. Ex *costa* media duæ magnæ laterales excurrunt, quæ iterum variè disperguntur. *Flores* solitarii, cum suis pediculis pilosis, spithamam plus minus longis proveniunt, pentapetali, circa basin stricti, ad extremitatem latiores, corrugati, albi, ac deinde flavescentes, tribus costis emi-

A

nen-




mentibus striati, pilosi, lanugine membranacea obsiti, transparentes. *Fructus* aquosi & fungosi, longitudinem pedis æquant, circa verticem crassiores; cortex, cum teneriores sunt mollis, pilis albicantibus obductus; vetustiores, durus, crassus, lignosus. *Semina* oblonga secundum longitudinem in latitudine fructuum conspiciuntur, primum albicantia, dein ex albo flavo fusca, quadrilateralia, ex opposito valde compressa, in medio nonnihil striata: nucleus albus est. *Succus* cum momento cumini sumptus, spontaneam lassitudinem, ac debilem tollit respirationem: *Foliorum* decoctum cum saccharo Ictericis prodest. Per totam hæc planta crescit Malabariam, in hortis excolitur & comeditur, florens tempore pluviali.

## T A B. I.

*Bela-Schara* hæc est *Raji Pepo vulgaris*; vide sis ipsius *Hist. Plant. lib. 13. cap. 2.*









Schakeri-schora lat.

உலகநெல் மட. mal.

چاقه‌آ جیاری Arab.


कुट्टी bram.



Cucurbita

Melopepo. L.







## SCHAKERI-SCHORA.

## TAB. II.



*Schakeri-Schora*; secundum Bramannes, *Polita-Cali-Dadi*; Lusitanos, *Bobara-Guinea*; Belgas, *Pepoenen*, altera species *Schora*, frutex est cum priori conveniens. *Radix* eadem & caules, sed hi minus angulati & pilis hirsutis ac asperis obsiti. *Folia* ejusdem formæ & magnitudinis, sed hirsutiora & in oris dentata, quorum etiam pediculi crassiores, longiores, hirsuti, ac spiculis aculeatis muniti. *Flores* quorum alii fructibus insident, alii sine fructibus proveniunt, grandiores, aureo flavi, monopetali, quinque partiti, crispatis, pilosis, exterius quoque crassis costis, viridibus, pilosis, altè eminentibus instructi, circa cuspides non ita flavi ac minus rubescentes. In medio illorum qui sine fructu prodeunt, *stylus* crassus & erectus est, croceus & gemmulis flavis farinaceis in totum confitus, quibus detritis, variis condensis flavisque striis sulcatus videtur; qui cum fructu, in medio stylum habent albicantem, superius in tres quasi ramulos divisum, quorum singuli duobus longis, surrectis, crassis rubro fuscis staminibus donati. *Calix* quinque oblongo angusta habet folia, viridia, pilosa, in medio nervo obducta. *Fructus* pene iidem; alii oblongi, alii plano rotundi, duorum pedum latitudinem adæquantes, in longum costis extuberantes, primum virides, dein in totum flavi, carne densa & sublava, interiori valde fungosa & crocea, saporis dulcis. *Semina* eadem serie videntur oblongo-rotunda & plana, superficie parum convexa & æquali, quorum pulpa candida est. *Succus* cum momento Muschati, debilitatem & corporis languorem sublevat. Inter edulia habetur & ubique invenitur.

## TAB. II.


Species hæc est *Pepo Indicus compressus maximus*, | ra folio non fisso, fructu albo maximo sessili. Joh. Bauh.  
*Morison. Hist. Oxon. Sect. I. Cap. 3. & Cucurbita aspe-* | Tom. 2. Lib. 16.

CUM.











*Cucurbita* L.

பேர்தொடி மல.

فخوبطالام Arab.


கூர்தொடி மல.



*Cucurbita*

*Pepo* B. L.







## C U M B U L A M.

## T A B. I I I.



Rutex qui Malabariensibus, *Cumbulàm*; Brämannibus *Cuvaly*; Lusitanis *Bobara d'Agua* dicitur; Belgicè, *Water Pepoenen*; inter edulia habetur & ubique in hortis excolitur, arenosa & lutea amans loca. *Radix* fibrosa & albicans. *Caules* fungosi, aquei, virides, striati, pilosi, spiculis albicantibus muniti, ad exortum foliorum claviculas emittentes. *Folia* in longis, crassis, viridi-claris, interius striatis, rigidioribus, albicantibus spiculis minutis, proveniunt pediculis, magna, cuspidibus eminentia, in margine excisa, aspera & pilosa, interiori parte viroris fusci, exteriori clari. *Costa* media duas laterales emittit quæ circa basin divaricantur, omnes eminent, maximè in adversa parte. *Flores* pene in similibus videntur pediculis, pentapetali, aureo flavi, exterius pilosi, pluribus crassis costis viridibus in longum obsiti, interius striati. *Stylus* in medio tripartitus, superiori parte capitulum efformans subflavum & plicis quasi convolutum. *Calyx* aliquo modo crassus & planus, superne circulo circumscriptus, foliolis parvis, cuspidatis, viridibus coronatim circumdatus. *Capsulæ seminales* coniformes sunt, virides & eminentibus costis striatæ. *Fructus* prægrandes, è genere *Cucumerum*, aquei, fungosi, exterius virides, oblongo rotundi, quorum caro seu medulla valde fungosa, aquea & flatulenta, saporis aquei. *Semina* respectu situs & formæ instar *Cucumerum*, saporis subamari. Tener hic frutex venenosus est, maturus è contra alexipharmacum; in febre calida ossium, ac tussi conducit, nec non in ardoribus pectoris, manuum ac pedum, si nempe fructus in conserva dentur; idem triti & cum butyro sumti veriginem sedant & appetitum promovent: semina trita & mixta cum oleo Schirgelim pro dysuria adhibentur.




## T A B. I I I.

*Cumbulam* est *Pepo oblongus* Moriss. *Hist. Oxon.* illas primo ex feminibus exoticis esse proger-  
*Seet. 1. cap. 3.* & quanquam hæ species etiam in minatas.  
 hisce regionibus inveniuntur, sciendum tamen











*Caca-palám* Lat.  
 വെളിച്ചമുണ്ടു Mal.  
 قحطيا جوار Arab.  
 കവടം gram.



*Cucumis*

*Dudaim. L.*







## CACAPALAM.

## TAB. IV.



*Aca. Palam*; lingua Bramannum, *Cavandely*; Lusitanorum, *Fruita Quisoute*, Belgarum, *Swalm Appel*, frutex est, densa amans nemora. *Radix* crassa est, brachium adæquans, ramosa, fibrosa, corticulâ exteriori flava, interiori nonnihil ruffa, & ex parte sanguinea, circa lignum albicans, in medio corculum radiis lignosis striatum habens, inter radios mollius, ac fistulis conspicuis in longum pertusum, saporis amari. *Caulis*, uti radix striatus, & fistulosus, superiora versus tenuis, striatus, glaber & viridis, multos transversos ejicit cauliculos. *Folia*, quorum pediculi striati, tribus seu quinque cuspidibus eminent, in recta parte hirsuta sunt & aspera, in adversa villosa, in margine dentata. *Costa* media utrinque duas alias emittit, in adversa parte eminentes. *Flores*, qui pediculis brevibus supra ex origine foliorum emergunt, albicantes, pentapetali, crispatis, interius plurimis longis, albicantibus filamentis obsiti, exterius tribus rubris eminentibus costis striatis, pedem habent oblongum, crassum, nonnihil nitentem, intus nonnihil lanuginosum, inferiori parte durum, rigidum, à superiori velut nodulo distinctum. *Calyx* ex quinque foliis constat rubris, angustis, cuspidatis. *Stamina* è medio emicant tria, cum suis oblongo rotundis & planis apicibus, & cum iis *stylus* ex rubro albicans, in summitate crassior, ac trifidus. *Fructus*, velut mala sunt oblonga, primum acuto apice armati, qui deinde decedit, initio virides, tum rubro obscuri, post magis magisque flavescentes, ac tandem in totum miniato pulchri, cortice tenui, pulpâ flavâ, quæ saporis amari. Intra pulpam numerosâ continentur *semina* oblongo rotunda & plana, singula ceruleo viridibus membranis involuta, variis filamentis sibi invicem annexa, odoris teterrimi. Matura semina ruffo fusca, valde amara.

Floret




Floret hæc planta mense Julio, circa *Paleoti*, semper ex radice de novo progerminans; nullius in medicina usus.

## T A B. I V.

Variae hujus generis inveniuntur *Colochynthides* | descripta est *Colochynthus oblonga* B. Pin. & *Cucur-*  
 uti videre est apud C. Baubinum in Pin. sect. 4. lib. 8. | bita aspero folio, amara, grandis, rotunda, viridis Joh.  
 Hæc ab Authore nostro sub nomine *Cara-Palam* | Baub. T. 2. lib. 16.










*Caijá-schorá* Lat.

കൈജം ചെട്ടന Mal.

كايچا جيتن Arab.

काहुवाट्टी bram.




*Cucurbita*

*ovifera* L.



قوله في كتابه

كتاب





## C A I P A - S C H O R A.

T A B. V.



*Aipa-Schora*, species est *Schora*; à Bramanibus, *Culivò-Dudi*; à Lusitanis, *Bobora-Calabassen*; à Belgis, *Fles appelen* & *Calabassen* vocantur, nascens in solitudinibus circa *Warapoli*, florens tempore pluvioso, ac cum prioribus in multum conveniens. *Radix* eadem, præter quod cortex sit amarus, & *caules*, & *folia* sed parum minora, non ita mollia & viridi fusciora, & *flores*. *Fructus* formâ & magnitudine differunt, minores enim sunt, rotundi, saporis valde amari, *semina* plane eadem, sed minora. *Succus* foliorum cum tantillo *Moschati* ructum abigit: medulla fructus immaturi trita & cum aqua calida sumpta vomitum promovet, pectoris angustiam tollit, prægnantibus prodest, capitis dolorem tollit, pro lotione adhibita animi deliquium tollit; cum seminibus trita phlegmata evacuat.

T A B. V.

*Caipa-Schora* est *Colochyntis Piriformis*, seu *Pepo Amarus* Bauh. Pin. Sect. 4. lib. 3.

## B I L E N S C H O R A.



*Ilenschora* eodem nomine ut cæteræ species cognita, cum prima specie pene in omnibus convenit, excepto quod *caules* sint quinque angulati, magis pilosi & crassiores. *Vires* cum illis *Caipa-Schora* conveniunt.


C

MUL.












*Mullen-belleri* Lat.

செடிக்காய்க்காய் Mal.

*Tana-fini*

तन्नीनी Bram.


سولان وولجيري Arab.



*Cucumis*

*sativus* L.







## MULLEN-BELLERI.

## TAB. VI.



*M*ulen-Belleri; Bramannicè, *Táva-Tini*; Lulitanicè *Pepinbo do Mato*, frutex est caulibus hirsutis, asperis, uti & foliis; floribus flavis, pentapetalis; corculum medium quinquilaterale est; fructubus Cucumeri formibus majoris generis ac spinosis; uno verbo, *Cucumis sylvestris*. Hujus, cum *Palmae* sylvestris tenera folia, cum tosto *Cumini* pulvere in aqua decocta, difficili ac sibilanti respirationi, & impeditæ diglutitioni medentur. Succus cum oleo *Sergelim*, & tosto *Cumini* semine haustus, vel cum *Feribeli* temporibus illitus, respirandi difficultatem ex ictu vel lapsu levat.

## TAB. VI.


*Mullen-Belleri* A°. 1684. ex Ceylone mihi transmissa & terræ mandata per tres annos continuos maturos protulit fructus, boni & grati saporis. Dissecti liquorem exstillabant flavescensem, car-

ne multum sicciore & densiore, quam Cucumeres vulgares, neque ita aquei, formâ oblongiores & angustiores.











*Picinna lat.*

മിമി 839 Mal.

بيڤنغا Arab.


पोसाळ Bram.



*Luffa*

*foetida. Cavan.*







## P I C I N N A.

## T A B. V I I.



*P* *Icinna* duæ dantur species, una ejus nominis, altera *Cattu-Picinna*. Prima Bramannibus, *Gonsaly*; Lusitanis, *Pátolas*; Belgis, *Traken* vocantur, frutex ex nascens in arenosis, qui etiam multis in locis excolitur & inter edulia habetur, bis quotannis frugens. *Radix* longè subtus terram in transversum excurrent, in superiori parte glandulosa, fibrisque barbatis vestita, cum cortice crasso, molli, humido & viridi, inferius albicans; intus humidis, laxis & lignosis filamentis instructus. *Caules* tenues, virides, quinquangulati, geniculati, ex geniculis claviculos emittentes, striati, minus lignosi, humidi, vetustiores in angulis asperi, teneriores raris ac brevibus pilis obsiti. *Folia* ex geniculis proveniunt, magna, anterius tribus armata cuspidibus, quorum medius maximus, duo reliqui minores, pilosa & aspera, in rectâ parte viridi fusca, in adversa diluta. *Costa* media præter alias minores, duas laterales emittit. *Flores* pentapetali sunt, rotundiores, parum oblongi, versus interiora crispatis convoluti, flavi, anterius flavo saturi, inferius pallidiores & subvirides; exterius quinque viridi dilutis, nonnihil pilosis foliolis, superius subflavis obsiti, interior striati. *Stamina* habent quinque brevia, viridi diluta & subflava, inferiori parte magis albescentia, superius in ramulos latos, tenues, plicatos ac corrugatos, superius subflavos divisa. *Calyx* ex quinque constat viri dilutis & cuspidatis foliis, exterius costulis in longum striatis. *Gemmæ* rotundæ, cuspidatæ, pyriformes. *Flores* gemini sunt, fructiferi, simul cum fructu erumpentes, ac eidem insidentes, reliqui non item, qui & sine fructu videntur. *Fructus* ipsi, cucumeris habent formam, in longitudine decem costis striati, spithamam vel etiam duas longi, cum cortice viridi fusco, intus carne fungosa, humida, saporis



aquei. *Semina* plana, compressa, oblongo-rotunda, primum albicantia, dein valde nigra ac nitentia. *Radix* decocta choleram reprimat, pituitam expurgat, & tumorem ventris tollit; Fructus, ceu illorum medulla ad pondus 3j. in aqua macerata & assumpta vomitum provocat; ex feminibus oleum contra impetiginem distillatur.


## T A B. V I I.

Hæc Cucumeris species jure merito, *Cucumis* à nullis, quod sciam, aliis Auctoribus descri-  
sylvestris Malabaricus, fructu striato amaro dici potest; pta.



CATTU.







*Cattu-picina* L.

കുറ്റിമുക്കു Mal.

قَطْوُ يَحْيَغَاء Arab.

माटिंगासळी Brm.



*Momordica*

*Luffa* L.




1840

1840

code 1111

1840





## CATTU-PICINNA.

## TAB. VIII.




*Attu-Picinna*; secundum Bramannes, *Matti-Gonsali*; Lusitanos, *Fruita-cota*; Belgas, *Kors-Appel*, nascitur in arenosis, circa *Cranganoor*, in densis nemoribus, ac etiam aliis in locis, plerumque frugens, ac in radice longo tempore superstes. *Radices* & *caules* cum priori specie conveniunt, ut & *folia*, nisi quod minora sint, superficie magis aspera, & costas tenuiores habeant. *Flores* iidem. *Fructus* ejusdem formæ, sine costulis tamen, sed decem radiis striati, minores ac non ita craffi; saporis valde amari. *Semina* paulò minora, in margine tenui limbulo circumdata. Nullius in Medicina usus.


## TAB. VIII.

*Cattu-Picinna* etiam ex genere est Cucumeris sylvestris, & à nemine descriptus; illam vero ut & alias præcedentes ad hoc genus pertinere, liquido ex omnibus notis constat caracteristicis; nisi forte ob summam amaritudinem pro specie Colochyntidis, haberi quis vellet.











*Pandi-páuel* lat.

പണ്ടി പാലു മല.

válli Caratí

वाळिकराती bram.


يَنْفِيْ يَاقُوْهَلْ arab.



*Momordica*

*Charantia* . L.







## P A N D I - P A V E L.

T A B. I X.



*Avel* quatuor numerantur species, *Pandi-Pavel*, *Erima-Pavel*, *Pável* & *Bem-Pável*: prima *Bramannibus*, *Valli-Carati*, *Lusitanis Folhas Margoseira com fruita grande*, *Belgis, Groot Bierblad* dicitur, densa amat nemora, florens tempore pluviali; loco *lupuli* adhibetur ad dequoquendam cerevisiam. *Caules* tenues sunt, virides, quinquangulares, pilis raris minutis obsiti, hinc inde claviculos emittentes. *Folia* quæ pediculis crassis, longiusculis, interius striatis proveniunt, qui passim claviculis sunt instructi, mollia, tenuia, pilis subtilibus, minutis, raris, maxime in rectâ parte obsita, in septem lacinias divisa, quarum anteriores longiores & cuspidatæ, ac in oris nonnihil angulatæ. *Costa* media pilosa, viridi diluta, duas transversales emittit, etiam in rectâ parte nonnihil eminentes, ubi folia viridi fusca & furda, saporis amari, odoris gravis. *Flores* inferiori parte foliolo viridi, parvo, rotundiori substricto, supra ex origine foliorum prodeunt, diluto flavi, pentapetali, tenues, oblongo rotundi, ad oras nonnihil crispatis, in adversâ parte costulis eminentibus, ac in rectâ vestigia relinquentibus, striati; in medio corculum habent, cum suo croceo capitulo, ex sex staminibus constans brevibus, albicantibus, quæ tribus datata sunt apicibus surrectis, croceis ac arcte in unum conjunctis; & sunt fructiferi vel non, quod cum reliquis speciebus ipsis commune est; nullius odoris. *Calyx* ex viridi albicans est, quinque oblongis & cuspidatis gaudens foliolis. *Fructus*, cucumeri formes, oblongo rotundi, in acutum cuspidem desinentes, totâ superficie majoribus inæqualibus tuberculis extuberantes, coloris primum albicantes ac parum viridis, dein flavo rubri & crocei; sub cortice pulpa latet humida, parum fungosa, in principio albicans, dein crocea. *Semina* plana, glabra, crassiuscula,

E

an-




anteriori & posteriori parte nonnihil cuspidata, oblonga, tria quatuorve numero, sacculis quasi membranaceis & carneis, corallino rubri & nitentis coloris investita, primo albicant, exin rufescunt, saporis subamari. Integra planta cum *Nala-Tirtava*, *Cinamomo* ac *Pipere* longo trita, atque aquæ *Oryzæ* oleoque *Marotti* mixta, unguentum suppeditat contra *Pforam*, *Scabiem*, *Papulas*, aliosque morbos cutaneos. *Folia* cum aqua calida è pota lumbricos enecant. *Succus* pruriginem abigit. Tota planta cum floribus *spinæ*, *curcumæ* viridi, *gingibere* sicco, *pipere* longo, aliisque unâ pulverisata, oleo *Marotti* tinctâ & candente ferro levigata, oleum fundunt, quo *Pfora*, *Pruritus*, *Impetigo*, imo ipsa *lepra*, liniendo tollitur; simplex ejusdem pulvis, *lepræ* atque ulceribus malignis obîstît.

## T A B. I X.

Pertinent hæc plantæ ad *Herbas Pomiferas Capreolatas*, sunt enim genus *Cucumeris*, præter hanc quæ sub nomine *Cucumeris Puniceæ Cordi*, seu *Balsamina rotundi folio repentis seu maris*. *Bauh. Pin.* venit. Ita Author noster varias adhuc ejusdem conspicias describit. Anno 1686. in *Horto Medico Amstelodamensi* maturos protulit fructus & semina;

quæ semina ex *Insula Mauritiæ* primum per *Dominum Isacum Lamotium* sunt transmissa. Etiam in *Insula Ceylon* aliisque locis inveniuntur. Ast quoniam hæc præ cæteris maximos habeat fructus, jure meritò *Cucumis Puniceus Indicus* fructu majore ex flavo rubente appellari potest.







*Pavel* lat.  
 പുറവേല Mal.  
 कानवी bram.  
 پاؤوہل Arab.



*Momordica*

*muricata* W.







## P A V E L.

## T A B. X.



*Pavel*; lingua Bramannum, *Carati*; non differt à *Pandi-Pavel*, nisi quod hujus fructus cucumeriformes, qui & eodem modo in superficie tuberosi sunt, minores, non ita oblongi, & infra cuspidem oblongum, ventre globoso. Planta in pulverem redacta, admixtis nigri *cumini* seminibus, *sale*, *assa foetida*, *zingibere* sicco, *pipere* longo ac *melle*, in pilulas formatis, ventris lancinationes & tormina sedant, flatus dissipant. Cum cortice *Panitsji* & quatuor speciebus *Alu* in aqua *Lanjæ* contusa, additoque limonis succo calefacta, insigne præbet gargarisma pro *Aphtis*. Cum immatura *Curcuma*, & sicco *zingibere* si succus extrahatur, cum succo limonum, tosto pulveratoque *Cucumi* semine ac saccharo candido permixtus, tussim sedat, phlegmata expectorat, & claram reddit vocem.


## T A B. X.

*Pavel* minor est conspecies plantæ præcedentis, sed ab Authore nostro non plenè descripta; discrimen tantum ponens in magnitudine & tuberositate fructuum, ad idcirco *Cucumis Malabaricus* fructu ex flavo rubente minor merito appellari potest; & est ipsissima planta quæ à Dom. Hermans in *Catal. Hort. Academ. Lugd. Batav.*, nomine *Cucumeris Punicci Zeylanici* indigitatur.












*Balia-mucca-piri* Lat.

බඩමුදා කුරුකුඩු Mal.

والباية مصغرة بيزي Arab.


കാറ്റി Bram.



*Momordica*

*dioica* Roxb.








## B A L I A . M U C C A . P I R I .

## T A B . X I .



*Alia-Mucca-Piri*; lingua Bramannum, *Carinti*; Lusitanorum, *Tindalica*; Belgarum, *Milten*; frutex est nascens in dumetis & locis silvaticis circa *Cochien*, semper florens vel frugens. *Radix* longè super terram extensa, hinc inde fibras emittit, rufo & subrufo cortice, intus viridis, aquosa & filamentis lignosis contexta, saporis amari. *Caules* inflexi, claviculati, quadrangulati, aculeati, viridi fusci, raris aculeis, qui cuspidibus versus posteriora reflexi sunt, obsiti, ad tactum asperi. *Folia* ex geniculis prodeunt, aculeata, interiori parte profundè striata, majora ut illa primæ speciei, in cuspidem minus acutum desinentia, in oris minutis crenis incisa, ad tactum magis scabra & aspera, crassioribus, longioribus hirsutis pilis obsita, interiori parte cancellis pertexta, saporis magis amari. *Flores* in cymis supra ex origine foliorum, tres quatuorve simul fructibus insident, pentapetali, crispatis & corrugati, flavi, vel etiam lutei, cum corculo cujus medium flavum, similes ut illi primæ speciei, sed triplo ferme majores, ac magis stelliformes. *Calyx* viridi dilutus & flavescent, ex quinque brevibus, angustioribus, cuspidatis constat foliis, versus exteriora inflexis. *Fructus* grandiusculi, oblongo-rotundi & cucumeri formes, ex una parte viridi fusci & nitentes, ex alia viridi diluti & albicantes, hinc inde acutis gemmulis eminentes, quorum cortex crassus, aqueus; caro etiam aquea, in qua semina eodem modo ut in cucumeribus posita sunt, sapor aqueus est & amarus, non sunt in eduliis. *Semina* oblongo rotunda & plana, seminibus cucumerum haud dissimilia. *Foliorum Succus* expressus & ad quantitatem unius uncie sumtus, omne venenum, ac dolores ex flatibus obortos tollit; in unctione adhibitus humores discutit. *Fructus* triti ac lacte vaccino permixti, vel etiam cocti,




phrenosin sedant, memoriam confortant, vertiginem tollunt, capiti appositi & colligati; tota planta, cum *Palmodecca* trita & in butyro decocta, idem præstat.

## T A B. X I.

*Balla-Macca-Pira* tertia species est *Balsamina Cucumerina* nostri Authoris, ac revera inter illam in delineatione non bene observatum. Nostro  
recenseri debet; quamvis autem descriptio dicet *judicio Balsamina Cucumerina Indica folio integro fructu  
caules tactu asperos esse & acutos, illud tamen variegato appellari potest.*










*Érima-páuel* Lat.

എരിമപാലാ Mal.

*Pageli*

പാലി Bram.

حَبْرِيَا وَوَهْل Arab.




*Momordica*

*hispida.*



9





## ERIMA-PAVEL.

## TAB. XII.



*Erima-Pavel*; Bramannes *Pávali* dicunt; Lusitani *Tindali-Spinosa*; Belgæ *Doorn-Milssen*; frutex est nascens post *Paelurti*, plerumque florens vel frugens. *Radix* magna, capitata, cortex ruffo-obscurus, caro densa & albicans. *Caules* quadrangulares ac glabri.

*Folia* multo majara sunt, mollia, lenia, pilis rarioribus ac minutis obsita, ad petiolum angulatim divisa, cum tribus laciniis, quarum media oblongior, costis in adversa parte, quæ etiam in interiori conspicuæ, striata, viridis fusci. *Flores* formâ & colore ut præcedentes. *Fructus* plane similes sunt, sed exactius oblongo rotundi, & bullis minoribus aculeatis, densis & æqualibus, unde quaque obsiti, primum in totum virides, dein ex parte virides, ex parte albicantes, cortice denso, carne alba fungosa, saporis aquei & minus amari, quare & inter edulia habentur. *Semina* plana sunt, rotundiola, parum convexa, ac in oris nonnihil ferrata, numero sex in circulum posita, sacculis membranaceis, carneis, rubris involuta, coloris albicantis. Planta hæc verè cephalica est; nam cum *Nuæ Indica*, *pipere*, *Cinnab: Mercurii*, *Sandalo rubro*, vel denique cum *Mattengu-Panna-Schelengu* & floribus *Neli* trita, aqua *Oryzæ* permixta, & in formam linimenti redacta, omnes capitis sistit dolores.

## TAB. XII.


Quinta hæc species est Balsaminæ Cucumerinæ, | & jure merito dici potest Balsamina Cucumerinæ, quæ hic sub nomine *Erima Pavel* describitur, | foliis integris fructu aculeato.

MUCCA-











*Muccá-piri* Lat.

മുക്കുപിരി Mal.

مُعَقِّي بِدَضِي Arab.


देवतवसीनी Bram.



*Bryonia*

*Scabrella* L.







## MUCCA-PIRI.

## TAB. XIII.



*Mucca-Piri* duæ dantur species, una ejusdem nominis, altera *Bullia-Mucca-Piri*; prima à Bramannibus *Deva-Teva-Sini* appellatur, frutex est arboribus se affigens ac nascens in arenosis. *Radix* longe supra terram se extendit, rufa est cum cortice subrufo, intus viridis, aquosa & amara. *Caules* tenues sunt & inflexi, angulati, in angulis acuti, & subtilibus aculeis, quorum cuspides interiora versus inflexi, condense obsiti, virides & claviculati. *Folia* ex cymis ceu inflexuris proveniunt, quorum pediculi rotundi, asperi, aquei, viridi-diluti, interiori parte subtili lyra striati & aculeis obsiti; oblonga, tricuspidata, crenata, superficie in utraque parte valde aspera, in recta minutis hirsutis pilis obsita, viroris diluti & furdi, in adversa dilutioris & parum nitentis, saporis sylvestris & subamari. *Costam* habent mediam quæ duas emittit laterales etiam in recta parte eminentes. *Flores* in cymis supra ex origine foliorum visuntur, duo, tres, quatuorve simul, cum suis petiolis valde brevibus ac viridi dilutis fructibus insidentes, minores sunt, pentapetali, lutei ceu flavo diluti, in medio striati & corrugati; corculum habent flavum. *Calyx* viridi dilutus, nonnihil pilosus, ex quinque brevibus, cuspidatis constans foliolis. *Fructus* baccæ sunt rotundæ vel etiam nonnihil oblongo rotundæ, parva cerasa referentes, ruboris valde saturi ac corallini, superficie glabri, pilis albicantibus rarissimis obsiti, carne intus albicante, succulenta ac nonnihil unctuosâ, saporis amarissimi, cum aperiuntur odoris gravissimi. *Semina* ceu grana inter carnem confertim confident, oblongo rotunda & plana, ad unam partem contractiora, coloris albicantis. In decocto data coleram sedat per sudores & urinam, dysuriam, gonorrhæum sistit, calculos infringit. Succus




expressus & cum aqua rosacea addito pauxillo Moscati assumptus, flatu dissipat; radicis decoctum idem præstat; quæ per se masticata, dentium dolores sedat.

## T A B. X I V.

*Mucca-Piri* quæ sexta species est *Balsamina Cucumerina punicea glabra, maculis albis notata* vocatur.










Covel lar.  
 കെടവൽ Mal.  
 Tenduli  
 തേടൂലി tam.  
 قَعْوِيل Arab.



Momordica

Covel.







## C O V E L.

## T A B. X I V.



*Ovel*; linguâ Bramannum, *Tenduli*; Lusitanorum, *Tindeli-Comprido*; Belgarum, *Milten*; frutex est nascens in saltibus circa *Cochien* & in aliis locis. *Radix* tenuis, albicans, intus filamentis lignosis pertexta, vetustior cinerea, lenta. *Stipes* crassitiem brachii adæquat, cinereo cortice obductus, nodis crassis extuberans, una cum ramis fasciam referens, intus filamentis lignosis, humidis & laxis, ac circa corticem carne subaquea pertextus. *Caules* foliosi, tenues, rotundi, glabri, virides, aquei, minus lignosi, cymis inflexi, ac ex illis hinc inde novos emittentes furculos. *Folia* cum claviculis ex convexa parte cymarum, pediculis mediocriter longis, crassitie caules suos superantibus & parum nitentibus in caulibus proveniunt, cucumerum foliorum formam referentia, textura densa & mollia, fractu facilia, superficie glabra & lenia, in recta, ubi etiam costæ conspiciuntur, parte, viroris fusci, in adversa dilutioris & furdi, saporis nullius, nisi aquei, odoris ingrati. *Flores* monopetali, campaniformes, quinque partiti, in totum candidi, cuspidati ac nonnihil crispatis, exterius versus cuspidem, tribus costulis viridibus & nitentibus, quarum media maxima est, striati, interius sulcati, densioribus & oblongioribus pilis, quam quidem exteriori parte, obsiti. *Stylus* è medio emicat albicans, crassior, capitulo plicato, rotundo, viridi claro, flaviusculo farinaceo rore consperso dotatus. *Calyx* florem arcte excipiens viridi dilutus, quinque vel sex angusta, brevia, cuspidata, versus petiolum inversa, & a se mutuo dissita habet foliola, quæ in cuspidem rubro colore tinguntur. *Fructus* cucumeri formes, ad longitudinem trium quatuorve pollicum, cortice in totum rubicundo croceo; sed cum teneres viridi fusco, nitente, punctulis ac etiam hinc inde albicantibus maculis intersperso; pulpa fun-




fungosa est, rubicunda & crocea. *Semina* ut illa cucumerum, sed minora, plana, oblonga, ad unam partem extenuata, primum ex flavo albicantia, dein crocco rubicunda, in propriis loculis confita, liquore magis gelatino & copioso, subfalso & subacido obducta, in orbem ad se mutuo sita, cum tenuiore parte cortici obverla. *Fructus* teneriores comeduntur. Est & alia species *Covel*, à priore nihil differens, præterquam quod fructus sint amari. Integra planta cum radice *Elà-Calli* ac *Cumini* pulvere cocta, gonorrhæam sistit; si febris adsit ac bilis orgasmus, adduntur *Sacchari* rubri ac flores *Néli* cum aqua orizæ; Folia cum recenti butyro contusa, in formam linimenti adhibita, exanthemata tollunt. *Succus* ex *Pada-Kelengi*, floribus *Néli* & hac planta expressus Cephalæam & præcordiorum æstum mitigat; cum saccharo sumtus bilem refrenat, radix in aqua decocta idem facit.

## T A B. X I V.

Septima hæc specis *Balsamina Cucumerina pinacea glabra, maculis albis notata* nomen gerit.







*Asplenium*




*Padaralam* Lat.

പടവളം Mal.

بَدْرِيَّةٌ وَفَلَّامٌ Arab.

പറവളം bram.



*Trichosanthes*

*cucumerina*. L.







## P A D A V A L A M.

T A B. X V.



*Padávalam* duæ sunt species, una hujus nominis, altera *Scheru-Padávalam*; prior linguâ Bramannum, *Pouli*; Lusitanorum, *Sabino*; Belgarum, *Kalpert* dicitur, frutex est repens ac claviculis sese arboribus affigens, nascens in arenosis circa *Mutan* & in aliis locis, florens mense Junio & Julio, odoris in totum gravis & maleolentis. *Radix* longè excurrit, minus lignosa, fibrosa & albicans. *Caules* quinquangulati sunt & striati, parum asperi, pilosi, aquei, minus lignosi, hinc inde inflexi, cinerei, teneriores virides. *Folia* quæ petiolis nonnihil pilosis, ex cymis una cum claviculis prodeunt, laciniata, ad petiolum excisa, texturâ mollia, superficie lenia, brevissimis ac subtilissimis pilis obsita, in margine hinc inde parvis apicibus emicantia, coloris in recta parte viridi fusci. *Costæ* albicantes sunt, in adversa parte eminentes. *Flores* vel fructubus insident, vel non, & hi plures congregatim proveniunt, parvi, albi, pentapetali, stelliformiter expansi, venulis paralellis in longum striati, in oris plurimis tenuibus ac candidis filamentis, quæ interiora versus contorta & crispa sunt, obsiti, superne nodulo communi flavo ad unum juncti; illi *stylum* habent viridi dilutum, in summitate albicantem ac tricuspdatum, apicibus subflavis instructum, ex fructu emergentem. *Calyx* quinque habet folia angustissima, cuspidata & viridia, inter unguiculos foliorum florum confita. *Gemmæ* oblongo rotundæ. *Fructus* qui pediculis brevibus, incurvis, viridifuscis & nitentibus adhærent, oblongo-rotundi, in conum ad imam partem nonnihil inflexum desinentes; quorum exterior cortex, primum viridis ac nitens, punctulis albicantibus aspersus, ex apice coni versus pediculum albis radiis striatus; dein ex flavo rubescens. In fructubus cum carne viridi diluta, fungosa ac succulenta, tres seminum



ordines visuntur, carnosis parietibus in longum ductis, qui in vertice coeunt, à se invicem interstincti; in uno quoque ordine quinque vel sex confita sunt *semina* tenera, carne tenui subviridi à se mutuo sejuncta; matura verò sacculis rubris, humidis, laxis inclusa, suntque oblongo plana, ad oras angulata. Decoctum cum saccharo sumtum, digestionem confert, tormina intestinorum, ac alios ventris doloris sedat, phlegmata expectorat, pectoris angustiam tollit; febres minuit, humores attemperat, vermes enecat. Succus expressus idem præstat & vomitum provocat. Radicis succus ad quantitatem duarum unciarum epotus, valde purgativus est, in ipsa accessione febrium quotidianarum ac quartanarum ex pituita provenientium, frigus vel diminuit vel in totum tollit, per vomitum scilicet: stipes in decocto datus phlegmati expectorando conducit: fructus quaquo modo sumti tumores expellunt.


## T A B. X V.

Octava hæc species est, quæ non immerito | *glabro ex flavo rubescente*, appellari potest.  
*Balsamina Cucumerina folio amplo, flore candido, fructu*



SCHE.







*Scheru-padavalam* Lat.  
ശേരൂ പടവളം Mal.  
جَهْرُ بِضَاءٍ وَفَلَامِ Arab.  
ചേരൂക്കി Tam.



*Trichosanthes*

*caudata* Willd.



U. S. - 1862

1862

U. S. - 1862

1862





## SCHERU-PADAVALAM.

## T A B. X V I.

**A**ltera species Belgicè *Klein Kalpert* vocatur, cum prima in totum conveniens, præter quod folia, flores, fructus, semina in totum sint minora. Vires etiam omnino eadem.

## T A B. X V I.

Nona species *Balsamina* hic quasi conspecies *Padavalam* ponitur, sed folia differunt ut & fructus; hæc enim longa, in margine incisa habet folia in acutum cuspidem desinentia; flores qui fructibus insident multo majores sunt, fructus vero minores, & est *Balsamina Cucumerina*, flore candido muscoso, fructu glabro.



TOTA



CUT

THESE IN THE MOUNTAIN


IT IS THE MOUNTAIN

Omnino exstingit



TOTA








Toti-pira lat.  
 തുളി മാ. mal.  
 Gorinti  
 ഗുളി bram.  
 طوطير ميرا arab.



*Trichosanthes*

*norvifolia. L.*







## T O T A - P I R I .

## T A B. X V I I.



*Ota-Piri* species est *Tindeli* vel *Milsen* Belgarum, frutex est qui circa *Cranganoor* invenitur, florens tempore pluvioso. *Caules* tenues sunt, cymis inflexi & parum angulati. *Folia* in cymis pediculis tortuosis proveniunt cum capreolis, formâ oblongi cordis,

ad pediculum excavata, antè in cuspidem stricta, in oris apicibus brevibus emicantia, viroris in recta parte fusci, in adversa diluti. *Costa* media duas laterales emittit. *Flores* oblongis, viridiusculis petiolis in ramis proveniunt, pentapetali, angusti, stelliformes, interius candidi, ac in oris oblongis, candidis filamentis, quæ mutuo implicantur, capillati, exterius viridi diluti, venis viridi fuscioribus nonnihil eminentibus striati, antè transparentes. Illorum collum, crassum ac turgens, è cujus medio capitulum teres, oblongum, flavescent, angulis in longum striatum, erumpit, nullius odoris. *Fructus* cucumeri formes ut illi *Padavalam*, sed oblongiores, & pluribus seminibus repleti. Ex foliis & alio medicamentum conficitur errhinum, pro morbo comitali. Ex succo foliorum & oleo 't *Zil-Elu* linimentum præparatur, quo maniacorum tempora summo cum successu perunguntur. Ex eodem succo cum pipere longo, *zingibere* & auripigmento pilulæ conficiuntur, oculis immittendæ, pro virulento serpentis morfu. *Cortex* fructus cum succo foliorum levigatus, in alienatione mentis, pro suffimigio adhibetur, funiculo laneo in illis immisso.

## T A B. X V I I.

*Tota-Piri*, decima species est, & non incommode *Balsamina cucumerina* fructu viridi striis albis appellatur.



The first part of the book is devoted to the description of the various species of the genus *Myrica*. The author begins with *Myrica maritima*, which is found in the coastal regions of the Mediterranean. He then describes *Myrica palustris*, which is common in the marshes of the same region. The third species mentioned is *Myrica fruticosa*, which is found in the mountains of the Alps. The author then describes *Myrica arbuscula*, which is found in the mountains of the Pyrenees. The fifth species mentioned is *Myrica aspera*, which is found in the mountains of the Apennines. The sixth species mentioned is *Myrica repens*, which is found in the mountains of the Apennines. The seventh species mentioned is *Myrica stricta*, which is found in the mountains of the Apennines. The eighth species mentioned is *Myrica stricta*, which is found in the mountains of the Apennines. The ninth species mentioned is *Myrica stricta*, which is found in the mountains of the Apennines. The tenth species mentioned is *Myrica stricta*, which is found in the mountains of the Apennines.










Bén-járel lat.  
 വെങ്കല വെള Mal.  
 Dadula-pagali  
 दादु लाफलाहि bram.  
 هجوزة عرب. Arab.

Momordica

tuberosa







## B E M · P A V E L.

## T A B. XVIII.



*Em-Pavel* ; Bramannicè , *Dadula-Papali* ; Lusitanicè , *Tapadeira da fula tristedodio* ; Belgicè , *Avond-bly* frutex est qui in *Cranganoor* invenitur, dumeta amans & loca silvosa, semper florens & frugens, quorum flores oriente sole pereunt, sed semper vespertino tempore novi succedunt. *Radix* oblonga, crassa, fibrosa, ruffo flava, cum pulpa densa ex albo flavescente, superiori parte strictior, oculum habet, qui radice emortua, suo tempore in majorem radicem excrescit. *Caules* tenues, striati, virides, quadrangulati, geniculati, rigidiores, glabri, ex geniculis claviculos tortuosos emittentes, intus virides & aquei, filamentis tenuibus, lignosis ac duris pertexti. *Folia* ex geniculis & claviculis, pediculis, oblongis, tortuosis, rigidiusculis, exterius planis ac nonnihil excavatis, viridi aqueis & humidis proveniunt, vel integra vel laciniata, ad pediculum lato sinu profunde excisa, in margine cuspidibus eminentia, vel lenia, quæ viridi clava, vel aspera, quæ fusciora sunt; saporis haud amari, odoris aliquantulum gravis. *Costa* media utrimque tres laterales emittit, in adversa parte eminentes, rectam striantes. *Flores*, oblongis, viridi dilutis, striatis & rigidiusculis pediculis, seu simplicibus seu ramosis in geniculis proveniunt, hecæ petali, oblongi, cuspidati, flavi & lutei, in adversa parte tribus costulis eminentibus obducti, interius tribus venulis striati, ac plicis in longum crispatis. *Stylus* cum suo capitulo, plicis striato, ac in plicarum oris croceo, è medio emicat umbilico, albicans & crassus. *Calix* flaviusculus ac nitens, florem in interstitiis foliorum arripit; suntque odoris fortis vegeti, haud injucundi. *Gemmæ* conicæ sunt. *Fructus* nulli. *Planta* cum cortice *Muricu*, sandalo, nigræ testudinis concha, ac aqua oryzæ trita, linimentum suppeditat, abscessus maturans & resolvens; si vero absque



que maturatione resolvere quis satagat, aquam *Lanjæ*,  
*apium* ac *sandalum* coctum addere oportet.


## T A B. XVIII.

*Bem-Pavel* etiam species & quidem undecima  
*Balsamina cucumerina* est, radice tuberosa, & fe-  
 cundum nostrum Authorem nullos ferret fructus,

ast ex omnibus circumstantiis liquet illam ad hoc  
 genus pertinere; fructuum descriptionem quod  
 attinet oblitam esse conjicio.









*Vehoemeka* Lav.  
*Kavanoali* brat.



*Bryonia*

*laciniosa*. L.







## NEHOEMEKA.

## TAB. XIX.



*N*ehoemeka; Bramannes dicunt, *Kavandali*; Lusitani, *Nhola*; Belgæ *Slitten*, nascitur in & circa *Catate* & aliis locis, florens mense *Januario*. Radix fibrosa. *Caules* tenues, angulati, viridi diluti, tortuosi, claviculis crispatis instructi. *Folia* pediculis longis, crassis, anterieus sulco striatis viridi dilutis, in caulibus proveniunt, in quinque laciniis angulosis profunde incisa, tenuia, mollia, fusca, saporis nullius, odoris grave olentis. *Costa* media laterales emittit. *Flores* vel cum fructu simul, cui insident, vel sine fructu proveniunt tetrapetali, viridi diluti, in unguiculis striati & pilosi, maxime in oris; in floribus sine fructu tria videntur staminula, laciniata, in oris laciniarum limbulo prædita; fructiferi vero unum viridi fuscum habent stamen ex vertice fructus emicans ac trifidum. *Calix* viridi dilutus florem, qui nullius est odoris, arcte excipit, pro numero petalorum quatuor vel quinque cuspidibus constans. *Fructus* rotundi, globosi, glabro cortice, primum viridi fusci, nitentes, lineis albis in longitudine hinc inde obducti ac maculati, dein sanguineo rubescentes, ac lineis albis remanentibus, post rufescentes, & cum sicci sunt, ruffo-albicantes. *Semina* in propriis sacculis continentur, membranaceis, pellucidis, cæruleis, intus aqueo humore, inflatis interstitiis à se mutuo desjuncta, passim bina, suntque officula cruci formia, clavum oculatum referentia, per cujus oculum stylus transmittitur in medio filamento oblitus, superficie non nihil scabra & ruffo obscura. *Foliorum* succus cum lacte vaccino epotus, bilem temperat: cum aqua *Lanjæ*, oleo *Sergelim* & tosti *cumini* pulvere febribus medetur: cum melle & saccharo, apprime conveniens remedium est contra febres, tussim, abscessus, internos flatus: cum aqua rubro *Lanjæ* respirandi difficultatem minuit, dentes firmat, flatus discutit.




## T A B. XIX.

Planta hæc *Bryonia* est *Ceylanica* foliis profunde lacinatis, ut videre est in *Catal. Hort. Acad. Lugd. Batav. Do. Hermannii*, vel ejusdem conspecies. Verum author noster flores tetrapetalos dicit, D<sup>o</sup>. *Hermans* pentapetalos, forte delineator erravit, ast respectu formæ & augmenti fructuum, speciebus *Balsamina cucumerina* annumerari potest.












Modikka lat.  
 மெட்டிகா mal.  
 boin-fual  
 मुंडकवाकि bram.  
 ما ضيقا arab.

*Convolvulus*

*paniculatus* B. L.







## M O D E C C A.

T A B. X X.




*Odecca* quatuor sunt species, *Modecca*, *Pal-modecca*, *Motta Modecca*, *Ovela Modecca*; prior lingua Bramannum, *Bui-Cuivali*; Lusitanorum *Narola*; Belgarum, *Croeselingem*, audit, frutex est densa amans nemora circa *Oedampare*, *Candanate* & alia loca, semper fere florens. *Radix* longa tres spithamas ac duas ferme crassas evadit, cortice primum viridi & albicante, fibras subtus & à latere emittens, intus densa, humida, albicans, non lignosa, circulis raparum instar striata, saporis pene nullius, oculos habet ex quibus novæ propagantur plantæ. *Caules* tenues, viridi-fusci, rotundi, glabri, brevioribus spinis binis & binis ex quibus claviculos ejiciunt, muniti. *Folia* quæ intra spinas proveniunt, difformia sunt, alia in cuspidem desinentia, alia in duas, tres, quinqueve lacinias incisa; mollia, plana, lenia, viridi fusca, in margine rubro limbo circumdata, passim tribus gemmis seu oculis in adversa parte instructa, duo ad pediculum qui rubro annulo circumdantur, saporis amari & sylvestris. *Costa* media alias transversales emittit, in utraque parte eminentes. *Flores* plures congregatim proveniunt ac claviculos ejiciunt, pentapetali albicantes, subflavi, filamentis in margine vestiti, ac in longum venulis striati, odoris nullius. *Stamina* in medio conspiciuntur quinque parva, apicibus albicantibus dotata, in quorum medio stylus sese erigit tenuis, qui ex principio fructus exoritur. *Calix* tria lata & tenuia habet folia. *Fructus* majores ut illi secundæ speciei, cortice primum viridi, dein in totum aurancei coloris, glabri sine rugis, tribus quatuorve subtilibus lyris in longum striati, quæ sese omnes, cum fructus ad maturitatem sunt perducti, relaxant; intus sub cortice lata capacitare officula continentes, quæ singula, candidâ, argenteâ, pellucidâ, membranaceâ ac apertâ quasi bursâ, involuta, in tribus quatuorve



ve seriebus disposita, formâ rotundo plana, in medio extuberantia, angustâ orâ circumscripta, superficie in totum aspera & scabra, primò albicantia, dein nonnihil rufo fusca, cortice minus duro, nucleo albo, qui subdulcis est. *Succus* expressus cum lacte *Coci Indici* sumtus angustias pectoris tollit: *Radix* trita cum *Parnenti* & aliis in oleo decocta ac interne adhibita artus corroborat, vires naturales auget; melancholiam abigit, præcipue in mulierculis, ac obsessis.









*Modikka-altera* L.

മുളക്ക്കു mal.

مُلْحَقَقْ Arab.


मूलीदोकाविकी bram.



*Convolvulus*

*paniculatus* L.







## PALMODECCA.

## TAB. XXI.


**P***Almodecca*, quæ & conspecies est *Narolæ* cum *Modecca* in omnibus convenit, floribus exceptis, sunt autem illi oblongo cyathi formi collo, quinque oblongorum cuspidum, albicantes ac subviridescentes; in medio quinque emicant *Stamina* viridi satura, plana ac foliosa, longis albicantibus pilis capillata; in medio illorum globulus est rotundus ex viridi albicans, invertice stylum gerens albicantem ac trifidum, in furculis planis, viridi dilutis, granulatis penicillis dotatum; florum petali fragiles sunt, & venulis viridiusculis intus pertexti, in fundo capillati, quinque minutis brevibus staminulis præditi: Nullius sunt odoris. *Folia* cum aqua *oryzæ* trita linimentum cephalicum perhibent, pro balneo adhibita febres curant algidas.













*Motta-modikka* Lat.

മട്ടാമുള Mal.

ماتى ما صفتى Arab.



*Convolvulus*

*paniculatus* L.



لَقَوْلِهِمْ كَلَّا



*MOTTA-MODECCA.*

## T A B. X X I I.



St & tertia species, quæ etiam conspecies *Narolæ* crescens eodem modo & in iisdem locis post *Angecamâl*, cum prioribus conveniens, præter quod fructus alii rotundi, alii oblongi ovales sint; rotundi tribus se relaxant futuris, oblongi ac ovaes duabus.

Planta oleo incocta, phtificis opitulatur: ex cortice radicis melle permixto linctus contra tussim præparatur.





M. A. B. A. R. I. O. S.

U. N. O. N. O. T. A. T. I. O. N. E.

It is a well known fact that the human mind is capable of receiving and retaining a great deal of information. This is the basis of all learning and knowledge. The human mind is a powerful tool, and it is our duty to use it to the best of our ability. We must strive to expand our knowledge and understanding of the world around us. This is the only way to progress and to improve our lives. We must not be content with what we know, but we must always be seeking to learn more. This is the true meaning of education, and it is the only way to achieve true wisdom and understanding.









*Orela-modékka* Lat.

ഒറിലമൊക്ക Mal.

عُرَيْلَا مُؤْضَاقِيَّة Arab.

*Convolvulus*



*gemellus* Vahl.



Handwritten text in Arabic script, likely a title or heading.

Handwritten text in Arabic script, likely a subtitle or descriptive line.

دالة لفظة بالبر





## O R E L A - M O D E C C A.

T A B. X X I I I.



*Rela-Modecca* conspecies *Narolæ*, belgicè *Kroeseling*, nascitur in *Berkencour*, quarta species *Modecca*, à prioribus non differt, præter quod illarum folia sint incisa, hujus non, vel rarius. Oleum per infusionem cephalicum est; cum butyro concocta planta, hæmorroides sanat: *foliorum* succus partum faciliat.

T A B. XX. XXI. XXII. XXIII.

Species hæc quatuor *Modecca* etiam pertinent inter *herbas pomiferas claviculis donatas*; ast quoniam cum aliis jam cognitis nullam habeant communem, per se relinqui debent; descriptiones enim duarum postremarum tam breves & imperfectæ; ut de illis nihil dici queat.


M

MO.













*Modira-Canizam* Lav.  
മോദികാ കറക്കി. Mal.

Karó  
कारो <sup>bram.</sup>  
ما حبرآ فحاجهبرام Arab.

*Strychnos*

*colubrina. L.*



~



## MODIRA-CANIRAM.

TAB. XXIV.



*Modira-Caniram*; Lusitanis *Pao de solor* vel *Pao da Cobra*; cum *Caniram* in prima parte descripta, in omnibus pene convenit, sed hæc arbor, illa herba, cujus fructus cortice duro, viridi fusco, & pulpâ interiore albicante, ac maturi spadiceo nigrescentes, cum illi *Caniram* miniate rubescant. *Modira* dicitur ob similitudinem mystacum, *Modira* enim mystax est. Natale solum est circa *Mangatti*, *Paroe* & alia loca, semper fere vel florens vel frugens. Folia cum *zingibere* & lacte ad consistentiam unguenti cocta, arthriditem, *Vilvada* Malabaribus appellata, abigit; balneum ex illis præparatum idem præstat.

TAB. XXIV.

Quantum laboris & quot conjecturas herba hæc doctis causaverit, videre est apud *Bauhin. in Pinac. lib. 12. sect. 6.* & *Joh. Bauh. Tom. 1. lib. 3. cap. 147*, est enim hæc *Caniram* secunda species istius generis. Semen quod in duarum harum specierum poma vel fructus continetur, vera est *Nux vomica* officinarum: prima parte; pag. 67. inter arbores est descripta, & Author noster primus est qui nobis veram hujus delineationem & descriptionem elaboravit ac dedit. Semina hæc in offi-

cinis perquam nota, vocantur enim ibi *Nuces Vomica*, belgicè *Kraan-oog*; lignum est ipsissimum lignum colubrinum. Fructus *Caniram* apud *Clusium Exot. lib. 2. cap. 9.* delineatus & descriptus sub nomine orbicularis fructus peregrini, & apud jam supra citatum *Joh. Bauh. Tom. 1. lib. 3. cap. 149.* sub nomine fructus peregrini granis uncis *vomica* similibus, plane idem videtur, qui à nostro Authore traditur.




MODICA CANIKAM

One of the most common of the Malabaric plants is the  
modica canikam, which is a small, round, green fruit,  
about the size of a pea, and is found in great numbers  
in the Malabaric country. It is a very common  
food for the natives, and is also used in the  
preparation of many of the Malabaric medicines.  
The fruit is very hard, and is not eaten until it  
is broken open, when the seed is found inside.  
The seed is very hard, and is not eaten until it  
is broken open, when the seed is found inside.



The fruit is very hard, and is not eaten until it  
is broken open, when the seed is found inside.  
The seed is very hard, and is not eaten until it  
is broken open, when the seed is found inside.








*Caraka-vágon* L.  
കരകവേഗ. Mal.  
قارقه و حجام Arab.  
साफस Bram.



*Aristolochia*

*indica. L.*







## CARLOE-VEGON.

T A B. X X V.



*Areloè-Végon*; linguâ Bramannum *Sapoéssi*; Lusitanorum, *Aterlusi*; Belgarum, *Kokerlingen*, herba est nascens in insula *Baypin*, florens tempore pluvioso. *Radix* tenuis lignosa, fibrosa, odoris fortis & aromatici, saporis acris & amari, cortice sub crusta nigricante flavo ac ligno albo. *Caules* nodulis distincti, nec claviculos nec radices emittunt, suntque vetustiores cortice cinereo, teneriores virides & angulati. *Folia* hinc inde in caulibus, parvis, tenuibus ac viridi dilutis pediculis, interius striatis, ex nodulis proveniunt, oblongo rotunda, cuspidata, tenuia, saporis acris & aromatici. *Costa* media in adversa parte, multis est comitata nervulis. *Flores* monopetali, oblongo rotundi, exterius viridi fusci, interius fusco rubri ac surdi, una cum nodo pugionem referunt. *Fructus* oblongo rotundi, in vertice plani, sex latera habent, quæ singula in medio nervo emicant, coloris viridis, in sex capsulas feminales oblongas, quæ membranaceis interstitiis sunt distinctæ divisi: plurimas in se triangulares, planas, subvirides & albicantes tessulas seu laminas continentes, in quibus singulis unum planum, & compressum semen, formâ instar cordis humani videtur, coloris flavi ac ruffi; saporis subamari & acris; odoris aromatici, ut ille zinziberis viridis. Decoctum hujus plantæ cum oleo pro linimento adhibitus venenatum serpentum sanat morsum. *Radix* trita cum aqua sumpta, vel in decocto data, idem præstat, febres frigidas, dolores capitis, ventrem tumefactum ac dysuriam sistit; pro lotionе usurpata dolores podagricos sedat; pulvis cum pipere trito & aqua calida exhibitus fluxum sanguinis sistit.

T A B. X X V.

Hæc *Carloe-Vegon* est *Aristolochia Clematidis*, at- | flore albicante, fructu majore, appellari potest.  
que ideo summo jure *Aristolochia Clematidis Indica*,


N

K A.











*Karivi-valli* Lat.  
 കരിവള്ളി Mal.


gointi  
 गोइठी Bram.  
 فخاريون واللي Arab.



*Bryonia*

*umbellata* W.







## K A R I V I - V A L L I.

T A B. X X V I.



*K*arivi-Valli; secundum Bramannes, Gointi; Lusitanos, *Popinho do Patore*; Belgas, *Karlingen*; nascitur in sylvis *Atroparotto*, *Belango*, & aliis locis, semper frondens & vel florens vel frugens. *Caules* tenues, rotundi, virides, leviter sulco striati. *Folia* in pediculis tortuosis proveniunt, claviculis comitata, formâ cordis, ad pedunculum excisa, spissa & glabra, viridis in recta parte saturi ac nitentis, in adversa diluti. *Costæ* in adversa parte eminent. *Flores* plures congregati supra exortum foliorum proveniunt, monopetali, quinque partiti. *Stamina* in medio tria habent albicantia, flavis gemmulis nodulata; nullius odoris. *Florum gemmæ* oblongæ, superne planæ, stellulam quinque viridi fuscarum venarum in vertice gerentes. *Fructus* oblongi, anterieus cuspidati, costulis eminentibus instructi, cucumeri formes, primò virides, dein croceo rubescentes seu aurancei, carne intus albicante, fungosa, quæ deinde flava evadit; sapor ut cucumerum. *Semina* oblongo sunt & involuta. Integra planta cum foliis *Muricu*, radice *Bel-adambu*, aqua ac butyro recenti trita, abscessus aperit. Ex hujus ac *Cadali* foliis succus elicitur, qui *oryzæ* aqua, *Cumini* semine, *Zinzibere* sicco ac *Allio* permixtus & exhibitus, sanguineam ac purulentam intestinorum excretionem, sanguineumque lotium sanat. Eiusdem & *Padda-Kelengu* radix cum pul-taceo fructus *Caniram* succo trita, maniacorum temporibus summo cum fructu illinitur; Eadem cum *Aracambulla* aquæ incocta ac cum butyro & lacte mixta confert in gonorrhæa, dysuria, Pitao morbo, de quo supra, veneno, aliisque ex adusto bile notis malis: pro sola gonorrhæa conducit ejusdem pulvis cum *Sandalo*, radice *Mottengu*, lacte, saccharoque commixtus.

T A B. X X V I.


Hæc Karivi-Valli, ratione fructuum cum conspicietur *Aristolochia* convenit.

K U-











*Kudici-valli* Lat.

കുടിവല്ലി Mal.


فُخُورِجِّي وَاللِّي Arab.



*Merremia*

*convolvulacea.*







## KUDICIVALLI.

TAB. XXVII.




*Kudicivalli* ; secundum Bramannes, *Bajasajo* ; Lusitanos, *Folhas da Coroa* ; Belgas, *Kroonblad*, nascitur circa *Warapoli* ; & in aliis locis, florens mense Septembri, Octobri, Novembri, *Cauliculi* tenuissimi, rotundi, virides, lignosi. *Folia*, capreolis comitata, optimæ sunt formæ, lilia coronæ Imperatoriæ referentia, tenuia, lenia, viroris in recta parte fusci & furdi. *Flores* pediculis ramosis, tenuibus, viridi dilutis, qui ad originem foliorum erumpunt, quatuor, quinque vel etiam sex simul congregati proveniunt, monopetali, campanæ formes, in longum venulis, in utraque parte eminentibus, obducti, circa oram coloris flavi & perpulchri, in collo viridi albicantis, nullius odoris. *Stamina* è collo emicant quinque tenuia, oblonga, albicantia, albis instructa apicibus. *Stylus* oblongior, valde tenuis & albicans, bifidus, nonnihil nodulatus, cum capitulo albicante. *Calyx* quinque cuspidata habet folia, florum colum arcte excipiens, coloris viridi fusci. *Florum gemmæ* plano rotundæ, in cuspidem strictæ. *Capsulæ seminales* quatuor obtusis ac rotundis angulis emicant, futuris eminentibus inter angulos, & per illorum medium obducti, coloris primùm viridi fusci, dein fusci nigri. In unoquoque angulo, duo triangulata reperiuntur *Semina*, uno latere rotundo, duobus planis, intersepimento sejuncta, coloris primò viridi diluti, dein nigricantis. Extra usum in Medicina est.














*Vinja* Lat.

2 മൂല മാല.

*Piru-dukka*


ഗുരുതാ bram.

وینجاء Arab.

*Cardiospermum*

*Halicacaba*. L.







## U L I N J A.

## T A B. X X V I I I.



*Linja*; Bramannes dicunt *Piru-Dukka*; Lusitani, *Fruita-Bolsa-China*; Belgæ, *Timpen*, herba est florens in principio & sub finem temporis pluuiosi, cuius natale solum est circa urbem *Cochien*. *Caules* latè se diffundunt, claviculis suis tortuosis arboribus se affigentes ac circumvincientes. *Radix* lignosa, hinc inde in bullas turgescens, fibrosa. *Folia* in petiolis propriis, tenuibus, viridibus, striatis videntur, supra tres ramulos spargentes, tria in unoquoque ramulo, incisa ut illa *Petroselin*i, tenuia, lenia, viroris furdi, interius & exterius subtilibus costulis striata. *Flores*, supra ex origine petiolorum foliaceorum oriuntur, in propriis pediculis perinde ac folia, qui duastenuces, breues, valde intortas ejiciunt claviculas, supra quarum exortum, se in tres findunt ramulos, terni in singulis ramis, suntque parvi, octopetali, quorum quatuor exteriores oblongo rotundi, in latum expansi, in totum candidi, interiores angusti, surrecti, quorum duo qui se mutuo adjacent, in superiore parte flavi ceu crocei, quatuor viridibus substringuntur foliis, ac illorum duo oblongiora sunt & foliis exterioribus candidis æqualia; duo contractiora. *Stamina* in iis conspiciuntur octo, candida, tenuia, apicibus albis subflavis nodulata. *Stylus* in medio crassus, viridis, angulatus, in vertice stellula albicante tricuspidata signatus. *Capsulae seminales* folliculi sunt virides, plano triangulares, qui inflore ipsum folium constituunt, singuli anguli nonnihil in latus excurrunt, in medio sutura obducti, ac per membranas intermedias stylo medio affixi, in tres loculos distincti, in vertice tricuspide parvo, rubro dotati, ad pediculum quatuor parvis foliolis succincti. *Semina* in iis terna, in unoquoque loculo, unum, angulis suis quam firmiter stylo medio annexa, suntque rotunda, primum viridia, dein spadiceo




nigra, ultimò nigra, ac si atramento essent suffusa, ad ungulam semilunula albicante signata. Planta cum aqua trita & affectæ parti illita, arthritidem curat & artuum ex frigore rigiditatem. Ex foliis succus elicatur, & cum oleo foliorum de *Enfermo* ceu *t'ZitAvanacu* mixtus, alvum ciet: idem tepidus cum successe arthriticis propinatur; cum nigro *Cumini* semine puncturam ex cardialgia ortam abigit. *Folia* trita tussi medentur; cum impuriore saccharo mixta, & in oleo concocta, oculorum vitiis succurrit.

## T A B. X X V I I I.

Planta hæc est *Halicacabum peregrinum* multis, | vesicarium, fructu nigro alba macula notato, B. Pinac.  
sive *Cor Indum Lobelii*, & *Joh. Bauhini*; vel *Pisum*










Nāga-vālli vel Mandaru-vālli lat.

നാഗ വാളി Mal.

Lerpata-vālli

ലർപ്പാതി bram.


نقغغ والير arab.



Bauhinia

divaricata. L.







## NAGA-VALLI

Vel

MANDARU-VALLI.

TAB. XXIX.




*Aga-Valli* vel *Mandaru-Valli*; Lusitanicè, *Trapadeira da Cobra*; Belgicè, *Aalclim* vocatur; herba est quæ nec floret nec fructet, semper virens circa *Mangatti*. Folia in furculis viridibus, striatis, qui & ad exortum & superne extuberant, proveniunt, in medio ad extremitates bifida, antè duobus cuspidibus oblongis, angustis eminentia, tenuia, lenia, viroris communis. *Costa* media in utroque latere tres emittit laterales, rubescentes, suntque folia saporis subastringentis, ac tenera sanguineo rubescunt, foliis *Belutta Mandaru* quàm simillima. Planta hæc cum lacte & recenti butyro trita ac capiti inuncta cephalalgiam, ac cum nares tum oculos corrodentem catharrum edulcorant: *Gemmæ* cum minio & alumine mediante *Oryzæ* lotura in pilulas formantur pro oculis ex cephalæa tumentibus & inflammatis; cum succo *Carimbolæ* contritæ parotides internosque glandularum tumores imminuunt; *Radix* cum aqua *Oryzæ* & butyro recenti pro frontale adhibita idem præstat.











Naga-mu-valli lat.

നാഗമുളി mal.

Serpata-valli

ഇടലാൻ <sup>gram.</sup>


سقوق والى <sup>Arab.</sup>




Bauhinia

scandens L.















*Nāga-mu-vālli* Lat.  
 نَگِ مَوْ قَلِّي Arab.

*Bauhinia*

*scandens* L.







## NAGA-MU-VALLI.

TAB. XXX. &amp; XXXI.



*Naga-Mu-Valli*, à Lusitanis, *Bastao de jogi*; Belgis, *Bedelhoud*, vocatur, nomen traxit à serpente qui lingua Malabarica *Naja* dicitur, eo quod stipites serpentino ductu sinuantur, suntque Jovi sacri, quos in itinere secum ferunt; nascitur in terreo & elato solo circa *Tirthour*, *Berkencour* & alia loca, semper progerminans ac longè à radice arbores transcendens, flores vero nec fructus unquam deprehendi possunt. *Folia* in petiolis oblongis, viridibus, tenuibus, ad exortum & superiorem partem majori crassitie extuberantibus, proveniunt, suntque uti folia *Mandaru* ad pediculum, ut & antè in medio profunde incisa, & duobis angustis cuspidibus eminentia, texturâ tenuia, superficie lenia, viroris in recta parte fusci & nitentis, in adversa dilutioris & surdi. Costarum figura ut & propagatio jam præcedenti tabula sunt descripta. *Stipites* complanati, lati, septem, vel octo ferme digitos transversos, ac pollicem plus minus crassos evadentes, sinuati, extuberantes, ac frequenter superne ex convexa parte, furculos ramosos, qui foliis vestiuntur, emittentes, ac etiam hinc inde spinas oblongas, supra furcatim divisas, ac annulatim seu barbatim intortas; primum virides sunt, vetusti ligno durissimo ac cortice crasso & valde duro, ruffo fusco & lignoso, tam arcte ligno agglutinato, ut nullo modo deglubi queat; suntque præterea secundum longitudinem hinc inde fissi, spinis quoque duris & lignosis instructi. Ramus hujus plantæ à doctissimo D<sup>o</sup>. *Paulo Hermans*, in celeberrima Leidenfium Academia Botanices Professore celeberrimo, asservatur. In Medicina ignoti est usus.

TAB. XXIX. XXX. XXXI.


Cum duorum horum generum *Clematis* nec flores nec fructus sint inventi, difficile dictu inter quas pertineant species.

PE.











Perim-kaku-valli lat.

പരിമകകുവല്ലി mal.

garail

ഗറൈല bram.


پھریج قاقو والی amb.




Acacia

scandens L.













Perim-kaku-valli *lat.*  
 പെരിമ കകുവള്ളി *mal.*  
 garais  
 गाराई *bram.*  
 قاقو' وللي *arab.*




*Acacia*

*scandens. W.*














*Pezom-kaku valli* lat.

പെസംകകു വള്ളി mal.

*garail*

ഗാരൈ bram.


قزيم قاقو والي arab.

*Acacia*.



*scandens* W.







## PERIM-KAKU-VALLI.

TAB. XXXII. XXXIII. XXXIV.



*Erim-Kaku-Valli*, Lusitanicè & Belgice *Gairo* audit, herba est nascens post *Mangatti* & in aliis locis, semper virens, & fructus vel maturos vel immaturos habens; ob usum fabarum quæ alvum & vomitum promovent inter mercaturas numeratur. *Stipes* immani fit crassitie, quinque hominum amplexus implens. *Rami* transversi longè latèque super arborum vicinarum fastigia repunt, primò virides, dein nigricantes. *Folia* in furculis communibus viridibus, qui ad exortum ventre extuberant, ac interius sulco sunt striati, geminata & in duabus proveniunt seriebus, oblongo rotunda, uno latere, quod à petiolo medio aversum, latiori & rotundiori, texturâ parum tenuia & rigidiuscula, viroris in recta parte saturi, in adversa diluti, saporis sylvestris. *Costa* media viridi-albicans utrinque eminet aut maximè in adversa parte. *Flores* conferto proveniunt numero omni ex parte furculo circumpositi, ac sibi mutuo valde vicini, præcipue cum in gemmis sunt, quæ se in quinque aperiunt folia, stelliformiter cuspidata, viridia. *Stamina* ex illis emicant decem oblonga, apicibus viridibus instructa, quæ deinde pallidè flavescent, ac postea crocea suffunduntur colore. *Stylus* inter illa brevis ac rubeus se offert; suntque flores odoris grati, mellini, qui ad fastigium furculorum consiti, diutius in gemmis clausi manent, inferiores prius aperiuntur. *Flores* hi, utut parvi, & à communi forma florum fabaceorum recedentes, dant filiquas illas prægrandes; aut cum maxima parte decidant, ac nullum in iis filiquarum appareat rudimentum, hinc diu dubitatum utrum falsi sint nec ne, sunt autem hæ filiquæ, quæ in ramis pediculis crassis, lignosis dependent, immanis magnitudinis, longitudinem quinque, sex septemve pedum, latitudinem palmæ adæquantes, rectæ vel passim tortuosè annulariter, aliisve modis inflexæ, duo

Q

com.




complanata habentes latera, & in utroque latere crassa costa præcinctæ, foras cochleata cavitate extuberantes, striatæ, odorem florum *Kaida* spirantes, quarum cortex viridis si vulneretur, resinofum, pellucidum ac candidum gummi exsudat; cum ficcæ sunt, cortex durus, lignosus, corneus ac cinereo nigricans est, exterius transversis striatæ fulculis, in utriusque limbi parte instar atramenti nigerri- mæ, glabræ ac nitentes. Longo hæ filiquæ tempore ramis adhærent, ac etiam in illis viluntur, cum furculos de novo floriferos ejiciunt. *Fabæ* in una filiqua triginta, plus mi- nus, singulæ in suis loculis continentur, per intersepi- menta transversa sejunctæ, convexo limbo, filiquæ ad an- gulum loculi sui inferiorem, filamentis longis adhærentes, nucleum habent album, cujus pulpa dura, densa, pinguis, oleosa: teneriores fabæ corticem habent candidum & ni- tentem, ac valde crassum, venis minutis concellatim con- dense pertextum, cujus sapor astringens; pulpam intus candidam, aqueam, in duobus lobis divisam, saporis aquei sylvestris, subamari, intra lobos oculo præditæ; ficcæ multo sunt contractiores, & futuris mediis laxatis seu ru- ptis se solvunt, inter nuclei lobos larga cavitate turgentes.

## T A B. XXXII. XXXIII. XXXIV.

Inter omnes species *Lobi* adhucdum cognitæ, hæc maxima est, à nemine ante hac descripta. Semina vel fabæ tanta copia inveniuntur, ut totæ naves cum illis onerari possint, ad varios adhibentur usus, planæ similes descripsit nobis doctissimus *Clusius*, *Exor. lib. 3. cap. 8.* sub nomine

*Lobi crassi*, ex insula *S. Thomæ*, & refert quod ob cordis figuram à nonnullis *Cor S. Thomæ* vocatur, sed magnitudo nimium differt; ut & *Joh. Bauhi- nus*, *tom. 2. lib. 17.* sub nomine *Phaseoli novi orbis* sive *Fabæ purgatricis latissima variatio longioris*.







Nai-coraná lar.  
 നാമകോരാന mal.  
 نَعْرِ قِمْعُ arab.  
 കൂടാ bram.  
 quilo



*Dolichos*

*pruriens L.*



Handwritten text at the top left, possibly a date or page number.

Handwritten text in the upper middle section, appearing to be a title or heading.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of script, likely in a South Asian language.



## N A I - C O R A N A

T A B. X X X V.



*N* *Ai-Corana*; secundum Bramannes, *Guilo*; Lusitanos, *Fabas Cuseira*; Belgas, *Maagde Kruyt*, floret mense Julio & Augusto, circa *Mangatti*, *Poiga* & alia loca. *Radix* fibras suas capillatas latè supra arenam diffundit, cujus cortex albus, infuscatus, filamentis lignosis minus arcte contextus, odoris gravis & aliquo modo acuti. *Cauliculi* rotundi, glabri, claviculati. *Folia*, quorum pediculi longi, glabri, rotundi, claviculati, terna congregatim proveniunt, oblonga, in cuspidem contracta, valde tenuia, superficie plana, glabra, raris ac minutissimis pilis obsita; medium hastæ simile est; lateratila ferme duplo latiora sunt ac magis incurvata. *Costa* media etiam in recta parte nonnihil eminet. *Flores* papilionacei, tetrapetali, difformes, quorum unus unguliformis, rigidus, transparent, venulis in longum striatus, dorso extuberante, ac cum stylo, qui ad dorsum aecumbit ungulam constituens, duo ad latus angulum amplectentes, surrecti sunt, oblongo angusti, venulis in longum striati, unâ parte ora parum rotundiori, colore purpureo-rubicundo-fusco: quartus ad quem ungula cum rostro inflexa est, brevior est, rigidiusculus, latus, unguiculas cæterorum succingens, purpureo albicans, odoris nullius. *Stylus* qui in ungula continetur crassus, theciformis, albicans, in tenuia fissus staminula, flavis apicibus, lingulisque in vertice dotata, in parte verò concava tenui lira striatus, tenui, libera, albicante staminula obducta, quæ stylum transmittit albicantem ac pilosum, è rudimento filiquoso oblongo ac viridi originem trahentem. *Calix* quatuor cuspidata, viridi diluta & difformia habet folia; maximum, breve florum folium, arcte substringit; duo angustiora sunt & minora, etiam unguiculas foliorum arcte complectentia; quartum laxum est cum cuspidelongiori, folia surrecta ad dorsum ungulæ excipiens. *Gemmae*  
flo.




florum cuspidatæ. *Siliquæ* quatuor ferme pollices longæ, & digitum latæ, ad originem & summitatem in contrarias partes intortæ, parum planæ, superficie exteriori in totum villosæ, seu pilis densis, longis, tenuibus obsitæ; urticarum instar non modo pruritum excitantes, sed etiam supra illas pungentes & ardentes, qui ardor non facile, nisi herbam *Thumba* pro antidoto adhibeas, tollitur; coloris ex una parte arancei ac nitentis, ex alia aranceo viridescentis. *Semina* seu fabas in se continent quinque vel sex, æquæ latas ac longas, à se invicem intersepimentis distinctas, oblongo sunt angustæ, loculis ex latere adhærescentes, coloris primum viridis, dein nigricantis furdi, saporis subamari. *Radix* decocta & assumpta urinam promovet; cum oleo concocta dolores arthriticos fedat; morbum sacrum, facta perunctione sanat; cum radice *Cocinil* & oleo insigne remedium est pro urina purulenta: *Folia* trita & apposita, summo cum successu in ulceribus adhidentur. *Fabæ* comestæ motus excitant venereos.

## T A B. X X X V.

*Phaseolus* hæc planta Zurattensis est *siliqua* hirsuta, pungente, *Cobuge* dicta, *Raji Hist. Morison. hist. part. 2. fol. 69.* Doctissimus *Rajus hist. plant. lib. 18. cap. 1.* de viribus hujus plantæ, hæc habet. Hujus plantæ *siliqua* duodecim, in duobus *cerevisiæ* sextariis infunde, & infusum proprina, ad quartam sextarii partem singulis matutinis, certissimum est hydropis remedium. Communicavit *Dr. Husband* *Eques auratus*, qui in insula *Barbados* aliquot annis vixit, ejusque sæpe in servis suis *Æthyopis* experimentum fecit.

KAKU.








*Kaku-valli* lat.  
 കക്കുവളി mal.  
*Cairóli*  
 काइरोली bram.  
 قاقو ولى arab.



*Dolichos*

*giganteus* var.







## KAKU-VALLI.

TAB. XXXVI.



*Aku-Valli*, lingua Bramannes, Lusitanorum, *Faba Coseira*, Belgarum; *Groot Maagdekruid*. Nascitur circa *Parou* & in aliis locis. *Radix* crassa, fibrosa, lignosa, cortice crasso flavo ac cuticula nigricante obducto, ligno albicante in circulos striato, à striis rectis, ex circulorum meditullio intrestincto. *Stipes* hominis crassitiem æquans, cortice crasso, fusco cinerescente in gummosum, ruffum, glutinosum liquorem, ubi insectus exsudante; rami rotundi glabri, virides. *Folia* in petiolis oblongis tenuibus viridibus qui ad exortum extuberant terna proveniunt, suntque oblonga antèrius cuspidata, spissa, crassiola, glabra, viroris in recta facie saturi & nitentis in adversa diluti: folia lateralìa latere quod à medio aversum, latiori. Cum Costa media, quæ costas transversas emittit ex petiolo utrinque una costa exit, in adversa maximè eminentes. *Flores* fabacei, tetrapetali viridi diluti transparentes ac rigidiusculi, unum folium brevius est & latius, oblongorotundum & venulis ex unguiculo lato nonnihil striatum, reflexum, alterum unguatum cum rostro folio latiori obversum; duo folia angustiora ad latus unguati folii confita, falcata, surrecta, cum ora rectiori folio latiori obversa, ac interius velut inflata; suntque flores in foliis colore viridi-diluto, in dorso unguæ exterius albicantes ac parum nitentes, odore nullo: intra unguatum folium stylus est albicans theciformis, versus folium latius inflexus, parte superiori in novem stamuncula, quæ apicibus flavo fuscis, surrectis dotata sunt, fissus, ad concavam partem ubi sulcatus lyra tenuè stamine libero adjacente, quod suo apice nodulatum obductus. Ex medio *Stylo* emicat filamentum tenue viridi albicans ex rudimento filiquæ quod in umbilico calicis est prodiens ac supernè capitulo crasso oblongo viridi fusco, piloso ac nitente

R

tente



tente nodulatus. *Calix* laxus profundiolus parte qua folium latius est, arctius substringens, & hinc inde ex altera parte arcuatis oris in cuspides breves sinuatus, colore viridi diluto & exterius longiusculis flavorubris aut fulvis nitentibus ac decumbentibus pilis, qui facile deteruntur, obsiti. *Gemmæ* florum oblongæ ac cuspidatæ, calice fulvo obtektæ. *Siliquæ* longiusculæ longitudine unius spithamæ, latæ tres pollices, pede stricto, arcto è calice laxo prodeantes; suntque compressæ in oris ad futuras quatuor alis, in singulo latere unâ, strictæ, cortice viridi, ac densis longiusculis, fulvis, nitentibus ac decumbentibus pilis dense obductæ, cum teneriores ac digitum plus minus longæ, in pilis fulvi aurancei, cum vetustiores fulvi ac spadicei, intus carne viridi diluta ceu albicante, suntque hæ siliquæ ut & folia calicis, ac petioli admodum pilosi insignem accerimumque pruritum excitantes: siccæ glabræ sine pilis ac cortice nigricante, & interiori corticula quæ præ siccitate laxatur spadiceo dilutæ & nitentes. *Semina* rotundiola & plana sunt, jacentque tria, quatuor quinque in una siliqua in latis loculamentis, quæ intersepi-mentis carneis a se mutuo distincta sunt, circumdata maxima parte in ora ungula viridi, quæ futuræ ex qua ungula procedit firmiter adhærent, cortice crasso, primum albicante, subflavo, nitente, dein spadiceo rubro ac nigrescente, intus pulpa candida, densa; tria horum feminum comesta mortem adferunt: In siliquis semina minuscula albicantia ceu candida capacitatem loculamenti tantum ex parte implere primum conspiciuntur, reliquam partem vacuum relinquentes. Hujus plantæ virtus in Arthritide conspicua est: ejusdem *folia* gravidas mulieres a capitis vertigine liberant, quippe & in aqua orizæ decocta superfluos humores exsiccant: illius *Cortex* cum zinzibere sicco, fructuque *Caringolæ* contritus & in oleo *fosule de Enferno* ac *Bepu* coctus oleum elargitur, quod medullæ spinali inunctum icheumata ac nocivos catharros compescit: Ejusdem *nucleus* rejecta interiori cuticula vaccino lacte ac butyro recenti coquendo permiscetur in Unguenti consistentiam, contra pustulas &



# M A L A B A R I C U S. 65

& ulcuscula in mulierum præsertim pudendis prodeuntia;  
Idem cum planta, *Felis Oculis* dicta in Orizæ lotura &  
ebutytrato lacte decoctus unguentum contra articulare  
morbum præbet; Idem efficit *radix* si cum radice *Carim-  
bolæ* & *Caniram* ac foliis *Muniæ* in linimenti forma usur-  
patur; vel si cum *Tamarindorum* cortice & *zinzibere* sic-  
co pulveretur, atque primo lactis fero, dein simul oleo  
*Bépu* incoquatur ad linimentum.

## T A B. X X X V I.

Conspicies hæc planta est præcedentis, sed o-  
mni ex parte major; atque ideo *Phaseolus Indicus* | *siliqua majore pungente*, summo jure, meo judicio  
appellari potest.




PUT.











*Putoja-paerú* lat.  
പുതുപാറു Mal.

*mugi*  
മുగಿ bram.


بوجيا يابرو Arab.



*Dolichos*

*pilosus* Willd.







## PUSTĴA-PÆRU.

TAB. XXXVII.



St species *Paeru*, lingua Bramannum, *Mugi*; Lusitanorum *Fabas Cuseira Pequeno*; Belgarum, *Klein Maagdekruid*, nascitur in *Angicacmal* & aliis locis, sinuosis ramis se vinciens. *Radix* fibrosa, lignosa, albo-rufescens. *Caules* ac rami tenues, pampini formes & cymis ad diversas partes reflexis, virides, pilis vestiti, ac ad tactum subasperi. *Folia* terna numero in petiolis viridibus, rigidis, pilosis ac spithmam ferme longis, qui ad exortum ventre crasso, aqueo, viridi diluto extuberant, ac interius sulco striati sunt, proveniunt pedunculis brevibus, crassis, suntque cuspidata, contextura tenuia, lenia, raris pilis in utraque parte obsita. *Costa* media laterales habet, utrinque eminentes, maximè in adversa: Medium folium lateribus est æqualibus; quæ ei lateralia, latere averso magis dilatato sunt, per quod costulæ transversæ ex petiolo excurrentes altius ascendunt, quam quæ per latus decurrunt. *Flores* sunt fabacei, coloris flavi, tetrapetali, quorum unum folium latius, rotundum & ex viridi magis flavescent, duo quæ folium ungalatum ad latus amplectuntur angustiora & magis saturè flava, & dilutè viridescentia: folium ungalatum magis ex flavo albicans ac se in duo folia velut findens; odoris expertes. *Stylus* ungalatus albicans ac nitens, supernè in decem *stamina* fissus, quæ flavis rotundis gemmulis dotata seu nodulata sunt, in se continens germen filiquosum cum filamento viridi, quod ex vertice emittit. *Siliquæ* rectæ, angustæ, duos tresve pollices longæ, longiusculis, hirsutis, subasperis pilis albicantibus obsitæ. In hisce filiquis parvæ *fabæ*, oblongæ, teretes continentur, in tractu longitudinis cum sua longitudine sitæ, ac intersepimentis membranaceis sejunctæ, decem plus minus in una filiqua, suntque primum viridi  
S fla-




flavescentes, siccae spadiceo fuscae, nitentes, gustu haut dissimiles ciceribus communibus, siliquae siccae exterius in cortice planè nigricant ac interius spadiceo diluti sunt coloris. Integra hæc planta cum quatuor *Alu* speciebus contrita atque in lotura orizæ *Patsjeri* (*Oriza Patzejri* oblonga teretia simul ac pingua habet grana, multæ enim sunt orizæ species ex quibus hæc quidem maximè apud Malabares usui Medico inservit) ac sero lactis addito melle in linimentum decocta exanthemata tollit: Cum nigro *sale* oleo *Foule de Enferno* mixta ptoram, pruritumque fugat: Cum vaccino lacte trita atque vel potiunculæ vel linimenti forma usurpata, morsus glirium & scorpionum malignitatem prepedi, endemiumque testium tumorem duritiemque minuit. Ramusculorum cortex cum *Mangeræ*, *Ambalangeræ* cortice contritus & in aquari orizæ decoctus atque ita spinali medulla illitus arthritidem eradicat, atque gonorrhææ virulentiam pellit, si cum *Mirabolanis*; radice *Mottenga* aliisque lotura, orizæ ac melli ad Cataplasmatidis consistentiam coquatur. Eadem porro miscella foliis *Perigil* addita, argilla obducta atque inter carbones torrefacta oleum effundit contra lepram & phagædemica ulcera: Radix autem cum foliis *Pavettæ*, *Hummatuque* trita succum stillat qui cum oriza *Patsjari* in cataplasma componitur ad lancinantes testiculorum dolores mitigandos; vel cum radice *Peragu*, tenellis *Peralii* foliis, ac virente *Curcuma* in lotura orizæ decocta, hæmorrhoidibus adversatur, quas si comitentur ulcera, sinuosa licet, commiscetur hæc radix *Zinzibere* sicco, *Calamo* aromatico, *Melle* atque *Cumini* semine tosto pro haustu: triturata porro eadem cum floribus *Tsjem-pariti* utroque *Sandalo*, foliis succoque *Betel* lentiginem, alphum, melamque delet, quod si successu careat adiungitur fructus *Tageræ* ac *Cynoglossæ* succus.

## T A B. X X X V I I.

*Patsja Paeru*, omnium est minima, ac etiam | descripta, quam ab hoc nostro, atque ideo de cum maxima à nullo, quod sciam, antea Authore | illis nihil vel ulterius indagari vel dici potest.


S C H A N-








Schanga-cuopi Lat.  
 മല. ചങ്ങ. Mal.  
 جيانغى چىشنام Arab.  
 gocarni  
 गोकर्ण Bram.



Clitoria

ternatea. L.







## S C H A N G A - C U S P I.

## T A B. X X X V I I I.



*Chángá-cuspi*; lingua Bramannum *Gocarni*; Lusitanorum, *Fabas de Brhamanne*; Belgarum, *Smalt kruid*, nascitur in campis circa *Warapoly*, semper florens; quæ etiam in Horto Medico Amstelodamensi excolitur. Cauliculis palmitum more currentibus se affigens. *Radix* brevis, tenuis ac fibrosa est & albicans. *Cauliculi* tenues, rotundi, lignosi, nodulati, viridi-clari cum teneriores sunt, pilisque minutissimis rarioribus obsiti. *Folia* bina & bina proveniunt in singulis furculis ceu furculorum ramulis, passim tria, paria, cum uno in vertice, quorum bina quæ cauliculi proxima, nonnihil minora reliquis, quod in summitate autem majus est; forma sunt rotunda, parum oblonga ac antè rotunda ora, tenuia, mollia, utraque parte pilis minutissimis sed raris obsita, subaspera, colore in parte adversa viridi-claro. E *Costa* media costulæ utrinque quinque vel sex oblique anteriora versus exeunt, utraque parte eminentes. *Flores* supra folia ex nodulis furculorum proveniunt, albicantes, fabacei, constantes foliis quatuor, unum unguiforme subviride cum stylo quem complectitur ungulam constituens, duo surrecta ungula intermedia arcte complectuntur, colore subviridi, in longum costulis exterius striata ac costula media viridi eminente, è qua hinc inde costulæ excurrentes oblique & annulatim reflexæ in oras incurrunt tractuum suorum lyras in recta parte relinquentes; quartum folium, quod exterius est & versus quod ungula inflexa, grandiusculum ac rotundiolum ac versus exteriora nonnihil inflexum, in exteriori superficie ex petiolo ceu calice instar ungulæ equinæ excurrentes & ungulam cum duobus foliis lateralibus circumplectens; nullius sunt odoris. *Stylus* viridis quem ungula in se occultat superius in filamenta de-



decem, quorum singula nodulis subflavis dotata sunt, se dividit, in se recondens filamentum quod in summitate pilis barbatum est, ac ex germine filiquoso prodit. *Calix* quinque foliorum *Siliquæ* longiusculæ, angustæ: *fabæ* oblongæ sunt & nonnihil compressæ, cum sua longitudine confitæ in longitudine filiquarum, quarum saturæ ad unam partem cum ungulis lateralibus adhærent, suntque primum viridi dilutæ, maturæ ac siccæ coloris cinerei ac nigris punctis conspersæ. Est & alia species *Schanga-cuspi* in nullo alio differens nisi in colore florum, qui cæruleus est. *Succus* ex eo expressus ac cum oleo de *Schirgelim* epotus vomitum excitat; ejus *Radix* trita & epota cum aqua calida ventrem laxat. Reliquæ virtutes ut illæ præcedentis plantæ.


## T A B. XXXVIII.

*Schanga Cuspi* est *Flos Clitorius Tarnatensis* Brey-  
ni. *Centur. I.* Ast hæc nostri Authoris flores ha-  
bet albos, & varietas in colore tantum consistit,

cum utraque detur species. Pertinet hæc planta  
inter genera *Phaseoli*.










Konni Lat.  
 𑂔𑂏𑂑𑂓 mal.  
 Zatená-gundi  
 रतनगुडी bram.  
 قحوي Arab.



*Abrus*

*precatorius. L.*







## K O N N I.

## T A B. X X X I X.



Omni; Lusitani dicunt, *Fruita Contsji*; Belgæ, *Ronde Weeg bónen*, secunda species est *Mangiellin*, nascitur circa *Cochien* & per totam *Malabariam* florens mense Augusto. Rami virides, ligno albicante. Folia in petiolis viridibus, qui ad exortum ventre viridi diluto extuberant, & interius lato sunt striati sulco, geminata ac in duabus proveniunt seriebus, oblonga, rotundâ orâ, texturâ tenuia, mollia, superficie plana, lenia, glabra. Costa media in adversa parte leniter eminet. Flores fasciati videntur, papilionacei, rubescences, ad dilute ad persicum vergentes, tetrapetali; quorum unum foliolum lato rotundum, internè circa medium sature rubescens, alterum unguatum angustum, cum rostro versus folium latius inflexum; duo reliqua angusta, surrecta, folium unguatum ad latus complectentia; odoris nullius. Stylus in medio theciformis, unguatus, candidus, nitens, in staminula, flavis apicibus nodulata, fissus, ac stamen breve viridiusculum includens. Calyx rotundus cyathiformis, viridi albicans ac subrubescens. Siliquæ oblongæ sunt, rectæ, ad latera compressæ, virides, maturæ flavescentes; odoris grati. Fabæ quæ in iis continentur, membranaceis intersepimentis à se invicem sunt sejunctæ, futuræ superiori umbilico adhærentes, rotundæ, duræ, coralline rubescences, ac macula nigra semilunulata variegata. Folia cum Calamo Aromatico cum aqua trita vel oleo incocta, lancinantes ex pituita salsa & acri ortos dolores sopiunt. Eorundem pulvis insolatione tostus & cum saccharo deglutitus, acriorem mitigat tussim. Succus expressus membrorum dolores ex frigore ortas abigit, crassos lentosque humores discutit, si cum lacte vaccino, oleo *Sergelim*, *Pipere* longo & *Zinzibere* ad linimenti consistentiam redigatur. Radix cum Cumino in aqua lævigata & assumpta, tenacem intestinorum



pituitam incidit ac corrigit. *Fructus* radici admixtus cum lacteo *Nucis* Indicæ succo, hæmorroidibus adversatur.

## T A B. XXXIX.


Konni magna species est *Abri*, à nemine antea descriptus; atque ideo meo iudicio *Phaseolus alatus major*, fructu coccineo, macula nigra notata; apud Indos etiam *Anacok* vocatur; sub quo nomine planta hæc mihi A°. 1685. ex *Sirinama* est transmissa. Tres hujus plantæ inveniuntur species,

quæ omnes ex prædicto venêre loco; illa nempe quæ hic describitur; altera *Phaseolus alatus* sive *Abrus minor* fructu coccineo, macula nigra notata, Morison; tertia, *Phaseolus Siranamensis trifolius*, fructu minimo striato, coccineo colore, macula nigra notata, perennis; quæ hodie in *Hort. Medic. Amstelod.* videre est.



ANA.







Ana-mullu lat.

മുളി മാ. mal.

hasti-canto

हस्तिकान्तो bram.


عنق سواحلي arab.



Amerimum

horridum.







## ANAMULLU.

## TAB. XL.




*Na-mullu*; lingua Bramannum *Hasticantò*; Lusitanorum, *Fabas Turquesca*, Belgarum *Maanbonen*; cujus natale solum est *Tecken-kour* & alia loca, florens tempore pluvioso, semper virens. *Radix* crassa, lignosa, fibras spargens, cujus cortex spadiceo dilutus, odoris suavis aromatici. *Stipes* pedem ferme crassus, cortice crasso cinereo, ac velut calce hinc inde consperso sub crusta cinerea viridi, ligno albicante duro, ac omni ex parte, maxime autem in pede spinis munitis numerosis, quæ quinque sex vel etiam plures simul ex tuberculis emicant; spinæ autem rectæ, lignosæ, duræ, cuspidatæ, quatuor pollices etiam longæ & pollicem quoque crassæ evadentes, cuspidate interdum inflexo ac intorto. *Surculi* ac rami ex stipite enascentes, tenues, spinis brevibus ac rarioribus obsiti, cum vetustiores nigricantes, teneri viridi-fusci. *Folia* proveniunt in furculis viridibus, tenuibus, qui quinque sex pollices longi, ac pilis brevissimis leviter obsiti sunt, & hinc inde ex ramis ac etiam spinis emergunt, brevibus rotundis pedunculis in duabus seriebus hinc inde appendentia; parva sunt, oblongo-rotunda, in medio anterioris oræ sinu parvo passim incisa, majuscula, quæ ad extremitatem furculi sita unum digiti articulum longa, pollicem ferme lata, contextura densa, superficie plana, glabra, virore in recta fusco & nitente instar *Veluti* ceu holoserici ob subtilissimam pilorum decumbentium lanuginem in adversa dilutiora; odoris nullius, saporis hortensis, cum teruntur fabacei. In medio una tantum est costula in adversa parte eminens. *Flores* umbellati in superioribus ramis supra ex origine petiolorum foliaceorum proveniunt, suntque parvi, papilionacei & candidi. *Stylus* unguatus theciformis, qui folio cavo

ac-



accumbit, viridi-dilutus, superne fissus in filamenta, quæ croceis apicibus nodulata sunt, filamentum viride quod ex filiquæ germine prodit, per se transmittens. *Calyx* qui florem excipit arctus brevium cuspidum; flores odoris grati, sed debilis. *Siliquæ* digitum aut amplius longæ, rectæ, unum aut duos pollices latæ, valde compressæ, lateribus oppositis arcte junctis, viridi dilutæ, venulis reticulatis striatæ, in oris viridi fuscæ. *Fabæ* quæ in filiquis arcte constrictæ valde planæ, oblongæ & lunulatæ cum sua longitudine in longitudine filiquarum, ac ferme in medio laterum confitæ, ac in medio concavæ oræ viridi uncinulo prominenti firmiter adhærentes in majusculis filiquis numero ternæ vel binæ, à se mutuo latitudine ferme pollicis distitæ, in minoribus una tantum; in filiquis autem soli obversis hæc lunulata femina conspicua sunt ac densiori & opaciori carne circumdata; suntque hæc fabæ lunulatæ, viridi-dilutæ & nitentes, saporis nullius. Præter hæc filiquas numerosi fructus spurii in inferioribus surculis visuntur, nulli vero in superioribus ubi flores vel filiquæ proveniunt, foliis omnes infidentes, ceu particulis foliorum marcescentium, adeo ut primo adspectu ipsis quoque foliorum particulis visui obtectis ramis surculisque insidere videantur, uno constantes folio, vel soli, vel bini, terni passim costulis mediis rarius lateribus infidentes; suntque oblongo-rotundi, viridi-fusci, in vertice uno tenui stilulo præditi, ac rarâ intus cavitate instar vesicularum inflati, in quibus singulis vermiculus albo-flavus hospitatur, cortice rigido, vitreæ ac fragili superficie, intus nitenti & glabra. Cum hujus plantæ spinis cortice dempto Malabares auriculas suas perforant, in quibus ad ornatum aurum gemmasque pretiosas gestiunt. *Vires* hæc planta mystica naturæ vi his incolis antipathetica vel sympathetica, inter amicos nolentes volentesve censetur; ejusdem folia in *orizæ* lotura ac *lactis sero* decoquuntur pro balneo contra ventris ex flatu & extravasata lymphæ intumescen-  
tiam; hujus porro simul ac *Beteleiræ* lignum tostum & in pulverem tritum exanthematibus ac exulcerationibus adversatur.








Paerú lar.  
ਮਲੇ ਮਲ.  
ਜਾਨਵਲੀ  
ਵਾਣੀ bram.  
پاپیون arab.



*Dolichos*

*batianus* L.







## P A E R U.

## T A B. X L I.



*P* *Aeru*; lingua Bramannum *Sanvali*; Lusitanorum, *Graos da Nossa Senhora*; Belgarum, *Heylbönen*; nascens in *Angiecamal* & alia loca, semper florens. Plures sunt species. *Radix* tenuis, albicans, fibrosa, in fibris rotundis globulis vestita. *Cauliculi* teneri parum lignosi, asperi & viridi diluti. *Folia* in petiolis longis, languidis, subasperis, interius late fulcatis, viridi dilutis, ac ad sui exortum extuberantibus terna proveniunt, ac communi petiolo pedunculis crassis rotundis, brevibus, viridi fuscis adhærent, suntque oblonga & cuspidata medium est hastæ simile ac lateribus uniformibus, maxima ad pedunculum latitudine, rectisque vel tenuiter incurvis oris in cuspidem stricta, quæ lateralia uno latere, medio folio proximum angustiori, altero vero latiori, ac ad pedunculum latè dilatato & exporrecto, suntque subaspera, colore viridi fusco, in adversa viridi-claro. Cum *Costa* intermedia costulæ utrimque obliquo annulari ductu superiora versus exeunt, in adversa parte eminentes, ac nonnihil in recta. *Flores* in summitate petioli surrecti rotundi qui ex origine petiolorum foliaceorum exoritur, tres quatuorve congregati brevibus pedunculis proveniunt, papilionacei ac cerulei, exteriora versus reflexi, uno folio unguato albicante quod cum rostro versus folium latius inflexum, ac interius hiat, & duobus oblongis angustioribus surrectis, cæruleo-saturis quæ rostrum unguati folii complectuntur. In medio *stylus* unguatus, theciformis, albicans, & supernè in stamun-



cula novem albicantia tenuia fissus, quæ apicibus flavis dotata, & in concava parte uno stamine, quod etiam flavum gerit apicem, obductum, ac filamentum viride in summitate barbatum, cujus exortus est in filiquoso rudimento, quod in se recondit. *Calyx* cuspidatorum est foliorum. *Siliquæ* rectæ, oblongæ angustæ petiolo longo appendentes, primum virides, dein flavescentes ac probe maturæ rubescentes. *Semina* quæ in iis continentur oblongo-rotunda sunt, umbilico futuræ affixa; maxima longitudine, in earum longitudine ad se invicem confita & tenuibus membranaceis intersepimentis sejuncta, siliquasque adeo implentia ut subtus corticem extuberent, colore primum viridi, dein albicante, denique ex maturitate flavescente ac ruffo. Hujus plantæ semina cum utroque *Sandalo* & *Cumini* semine tritis secundum artem in aqua decocta potionem emittunt in gonorrhæa utilem: Eadem cum fructu *Mottenga* vel *Nelica* & cortice *Patsjotti* atque *Mára-manjèl* aliisque in vaccino lacte decocta cephalicum sudant balneum: Ex iisdem *seminibus* fit pulvis qui alterutro *Sandalo* vel *Tamarindorum* contusis fibrillis, radiceve, vel succo *liquiritiæ* mixtus cephælæam ex viscosa pituita atque oculorum phlegmonem ex hac obstructione ortam corrigit: idem pulvis *Cumini* semine & *melle* commixtus præcordiorum ex mordicantibus halitibus oriundum æstum emendat. Cum floribus *Neli* & succo *limonis*, singultientibus propinatur: Trita eadem cum *tritico* tosto ac in farinam trito, *ficubus* Indicis elixatis pulveratisque ac *Zaccharo* candido semina exhibentur in inordinata bilis effervescentia, atque inde scaturientibus vertigine, pectoris æstu, oculorum caligine, phlegmoneque ac stomachi nausea: eadem cum immaturis *ficubus* *melle* aliisque comesta singultum cohibent: Mixta autem cum *allio* oleoque *Sergelîm*, *Bepu* & *foule*




*foule de Enferno*, id est *Foliis Ricinus* seu *Cit-avanacu*, unguentum præbent in artuum lassitudine & articulorum dolore, punctura, tremore, paralyfi, spasmo, aliisque ex malignis frigidisque humoribus ortis malis medullæ spinali inungendum. Hujus simul ac *Curundotti* radix cum *zinzibere* exsiccato in aqua decocta & cum Butyro epota, vel etiam additis *sempervivi* foliis tritis, linimenti forma usurpata, capitis dolores aufert. Notandum quod tanta harum fabarum quanta cæterorum ingredientium in singulis miscellis compositis debet esse quantitas, quæ apud hosce incolas communiter ad *Mirabolani* magnitudinem pro una dosi sumuntur.





fatis. Eadem, id est, fatis, seu fatis, arguitur  
 tum p[ro]pter in artum, lumbis & articulis dolor  
 p[ro]p[ri]os, tremor, p[ar]alyti, p[ar]alyti, aliis ex malignis  
 fatisque humoribus ortis malis modis p[ar]alyti in  
 gendum. Huius finis ac fatis, tunc cum  
 exsiccatio in aqua decoctis & cum fatis, vel  
 cum additis fatis, tunc cum fatis, tunc cum  
 fatis, capitis dolores. Huius finis ac fatis, tunc  
 fatis, quanta ceterorum ingredientium in fatis  
 cellis compositis debet esse quantitas, quae quod hoc  
 incolas componitur ad fatis, magnitudinem pro  
 una dosi funtione.









Kātu-paerú Lat.  
കാട്ടു പേരും മല.  
Cána-fanvali  
गानवली bram.  
قنّاطون' پایهرهف Arab.

Phaseolus

farinosus L.



1000

مَوْقِعُ





## C A T U . P A E R U .

T A B . X L I I .



*Atu-Paeru*; Bramannes dicunt, *Rana-Sanvali*, Lusitani, *Fabas Caringejo*; Belgæ, *Qualbónen*, circa *Palurti* & alia nascitur loca, florens tempore pluvioso. *Radix* longe prorepens ac fibris albicantibus vestita, intus ligno molli ac lento cortice, crassio, albicante ac lacteo, terreo-fusco colore. *Rami* seu *Caules* teneri virides & aquei, filamentis laxis pertexti, vetustiores, cortice terreo, fusco ac lacteo. *Folia* in petiolis viridibus interius lato fulco striatis ac ad exortum extuberantibus terna proveniunt, quorum duo transversa videntur cum tertio seu medio in vertice pedunculis crassis appendentes, suntque subaspera; virore communi sub fusco, in recta parum nitente & fusciori, pilis raris ac brevibus tenuiter obstita; transversa sunt laterum difformium, quorum quod à medio folio longius distat latius distenditur ac antè in cuspidem contrahitur. Quod in vertice, est hastiforme in cuspidem desinens & majusculum, uniformibus lateribus cum maxima latitudine propius ad pedunculum sita. *Costa* media costulas transversas oblique fundit, ac etiam cum iis in recta eminet, licet magis in adversa. *Flores* papilionacei, rosaceo saturi, purpurei coloris, quatuor constantes foliis, unum latum rotundum, albicans, exterius sub purpurascens, ac prope ad unguiculum macula flava notatum: folium unguulatum quod huic oppositum, latum & candidum est cum cuspidè seu rostro, quod versus folium latum inflexum, cochleatim intortum: duo folia quæ unguulatum ad latus amplectuntur ac falciformia una ora, qua a folio lato averfa convexiori sunt, ac antè rotundiori ambitu, & interiora versus crispa ac in inferiori parte oræ concavæ folio unguulato affuta & annexa, exterius rosa-



ceo-faturo-purpurea, interius dilutiora & albescentia, ex unguiculis ut folium latius venis striata. *Clausi* unguolata forma & virides. *Calyx* rotundus, viridis ad partem folii unguolati trium cuspidum, ac ad latera inferius duobus brevissimis foliolis seu cuspidibus succinctus. *Stylus* in medio theciformis candidus à folio unguolato exceptus in novem filamenta, oblonga quæ flavis oblongis apicibus nodulata sunt, supernè fissus, ac uno filamento in parte concava ubi lyra striatus, obtectus, transmittens filamentum crassum candidum, quod supernè flavo capitulo oblongo, estque cuspis intortus folii unguolati candidus & nitens, ob flavum istud capitulum, apicesque flavos transparentes, etiam flavum apparens. *Siliquæ* compressæ, rectæ, parum inflexæ, sex pollices longæ, medium digiti articulum, cum virides ferme latæ; suntque siliquæ primum virides, siccæ cortice ruffo diluto ceu flavescente, ceu argenteo & nitente. *Semina* quæ in iis confita cum uncinulis futuræ ventris annexa, ac in cortice extuberantia & in propriis loculis per intermedia farinacea candida intersepimenta a se mutuo diffita, in cortice extuberantia, lyris parallelis paulo obliquè striata; forma nonnihil quadrilatera ac convexa; primum viridia & nitentia, post coloris spadicei subviridis, ac signo uncinulæ albissimo. Integer hic *phaseolus* cum cortice *Mulæ* arboris in pulverem redactus, *Saccharoque* puro ac *vaccino* lacti incoctus gonorrhææ, *orizæ* vero loturæ commixtus flatibus, cum solo *lacte* præparatus dempto tamen cortice, diabete adversatur. Ejusdem *radix* cum *Feribeli* utroque *Sandalo saccharoque* ac consimilium virium aliis, addito *butyro* recenti in linimentum inspissatur, vel eodem omisso in pilulas mane diglutiendas formatur, vel etiam adjunctis *Sandalo*, *Butyro*, juscule *Gallinaceo* succo *liquiritiæ*, *lacte vaccino* &c. in balsamum excoquitur, atque tribus hisce modis contra quævis oculorum vitia, suffusionem, pterygium &c. servatis exactæ dietæ regulis cum utilitate exhibetur.



## TAB. XLI. &amp; XLII.

Fructus Paeru & Katu Paeru pro cibo adhibentur, ut illi Thola Paeru, *pari. 6. pag. 23.* descripti, qui uno communi nomine Kajan vel Katsjan appellantur; à Chinesibus Lak Goetum, qui hasce plantas omni cum diligentia excolunt, quorum nutrimentum valde bonum & confortans. Vide Nieukovii *Itinerar. pag. 268.* Secunda hæc Katu-Paeru species ejusdem est sylvestris; priorem Phaseolum Indicum trifoliatum minorem, flore caruleo, fructu minore; posteriorem Phaseolum Indicum trifoliatum sylvestre, flore purpurascens, fructu majore, nominavi.




CATU.











Kātu-tojāndi lat.

കടലാസ് mal.

Canavali

रानवाली bram.

فخاطون چيانضوي arab.



*Dolichos*

*rotundifolius* Vahl.



مكتبة



## C A T U - T S J A N D I.

T A B. X L I I I.




*Atu-Tsjandi*; Bramannice *Canavaly*; Lusitanicè, *Grao do Boy*; Belgicè, *Oyle bonen*, nascitur circa *Cochien*, florens mense Januario, semper virens. *Radix* brevis, fibrosa, nonnihil capillata, colore nigricante. *Cauliculi* sinuosi ac implexi, tenues, rotundi, colore viridi-flavescente. *Folia* in petiolis brevibus interius sulcatis pedunculis brevibus crassis nonnihil pilosis & sub-ruffis, terna numero proveniunt, quorum illud quod in vertice magis amplum, antè rotunda ora ac cuspidè brevi, ac exteriora versùs inflexo eminentia, colore viridi. Ex *Costa* media costulæ transversæ obliquè anteriora versùs excurrunt, in adversa parte eminentes, minus in recta transversis nervulis, venulisque cancellatim intertextæ. *Flores* qui supra exortum petiolorum foliaceorum congregati proveniunt, in surculis seu petiolis longioribus sunt papilionacei constantes quatuor foliis, quorum unum versùs quod unguatum folium cum suo rostello inflexum, latius est, ac in summitate tenui hiato incisum ac cum oris exteriora versùs nonnihil inflexum, colore exterius pallido albicante, interius rosaceo saturo cærulescente, unguiculo lato viridescente, in medio rima inferius fissum, colore rosaceo-ceruleo-claro: duo folia quæ unguatum ad latus amplexantur angustiora & inflexa, colore quoque ex rosaceo claro cærulescente: *Stylus* quem folium unguatum includit crassus, theciformis, candidus, versùs folium latius inflexus, supernè fissus in novem tenuia stamuncula quæ apicibus flavescentibus, crassiolis, farinaceis dotata sunt, ac lyra, quæ & stamunculo candido arcte impletur in concava parte sulcatum: in medio *stylo* filamentum candidum, crassum, quod viridi gemmula nodulatum est, inferne viridi-dilutum ex germine filiquæ emicans. *Calyx* florum rotundus & profundiusculus, viridi clarus & venulis in



longum striatus, ad partem unguati folii tribus apicibus nonnihil acutis & ad latius folium duabus laciniis rotundis latioribus florem arripiens ac succingens : suntque flores odoris suavis ac mellei. *Siliquæ* eædem ut *Catu-Bara-mareca*. Hujus *folia* cum cortice de *Canja* succum fundunt, qui cum *butyro* coctus glandularum tumores atque ecchymomata : cum *Sinapi* vero allioque trito, torrefacta & epithematis forma applicata ventris tormina dissipant, adjecto autem pulvere dicto *Malabaribus*, *Astasurnam-podi* suffumigium suppeditant, quod dolorosam artuum lassitudinem tollit.









*Baramareca* Lat.

മാളാ-വള്ളി Mal.

*Dala-vallu*

दासाम्बु bram.

دالامبو arab.



*Dolichos*

*gladiatus* Lacq.



لَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ



## BARA-MARECA.

## TAB. XLIV.




*B*ara-Mareca; Lusitani dicunt *Favas dos Paros* sativo; Belgæ, *Tamme Crimphonen*, planta domestica est & sativa, eadem cum priori, nisi quod siliquæ grandiores, quodque fabæ sint in eduliis. Nascitur in *Angiecamal* & aliis locis, fructus circa initium temporis æstivi proferens maturos. Hujus folia in aqua orizæ vel immaturæ nucis Indicæ succo contrita propinantur cachecticis: ex fructibus autem cum zinziberis sicci ac piperis longi mixtura fiunt pillulæ antispasmodicæ; ex iisdem, dempta interiori pellicula cum cortice *Muringu* triturationis, conficitur linimentum antiarthriticum, quippe hujus plantæ præstantia in arthritide elucescit, vel etiam cum radice *Vattæ*, *Calamo* aromatico, cortice maturo fructus *Arekæ* dicti *Pinang* in aqua *Orizæ patsjeri* & olio foliorum de *Enferno* mixtis, vel etiam cum *Curcuma*, cynoglossò Malabarico aliisque, lacteo Indicæ nucis succo, ac oleo foliorum de *Enferno*, vel denique cum tribus *Alu* speciebus orizæ lotura ac dicto oleo copulatis.











*Katu-baramareca* lat.  
 കടവുവാരമാര mal.  
*Cana-vallu*  
 കനാഡ ബ്ര.  
 قنطار و علاعرقا arab.



*Dolichos*

*cultratus* Thunb.?







## CATU-BARAMARECA.

TAB. XLV.



*Atu-Baramareca*; lingua Bramannum *Rana-Valu*; Lusitanorum, *Favas dos Paros*; Belgarum, *Krimphonen*, planta sinuosis ramis se vinciens nascensque in arenosis circa *Cochien* & alia loca, semper ferè florens, ac cum *Cáta Tsjándi* maxima parte conveniens, præter quod pene sit venenata, corpori noxia & dolorem excitans. *Folia* terna proveniunt uti & in *Cátu-Tsjándi*, suntque hæc oblongo-rotunda rotundæ oræ antèrius, cus-  
pide oblongo eminentia, contexturâ crassa, mollia, super-  
ficie lenia, virore utrinque fusco, superiori parte nonni-  
hil nitente; *Costa* media in adversa maxime eminet, minus  
in recta: à foliis *Cátu-tsjandi* differunt, quod illa multo mi-  
nora & rotunda sint ac antèrius obtusa ora sine cus-  
pide; hæc oblongiora. *Flores* fabacei forma, colore ac odore cum  
*Cátu-tsjandi*. *Siliquæ* nonnihil incurvæ ac ferme spithamæ  
oblongæ & tres quatuorve pollices latæ, in superiori parte  
maxima latitudine, dorso acuto, rotundiolo, ventre non  
acuto, sed plano, nonnihil concavo, pollicem ferme lato,  
ac antèrius in cuspidem protenso, & in dorso ac ventre  
limbulo ceu nervo viridi-fusciore obsitæ, lateribus valde  
extuberantibus & convexis, quæ proximè ad ventrem  
magis exturgescunt, & ad dorsum magis extenuata sunt,  
cortice crasso, qui primum viridis & glaber, & intus tunica  
carnosa, humida, subviridi obductus, siccescens colore  
spadiceo fusco & plurimis rimis ceu fissuris, quæ ex ventre  
oblique in dorsum excurrunt fatiscens, in interiori tunica  
argentei coloris ac villosus. *Fabæ* quas continent ac umbi-  
lico futuræ mediæ ventris, in cujus tractu relaxantur, ad-  
hærent, sunt oblongo-rotundæ & lateribus nonnihil con-  
vexis cum sua longitudine in longitudine siliquarum con-  
sitæ, in una ora laterum umbilico oblongo præditæ, cor-  
tice spadiceo ruffo & glabro, qui primum ubi fabæ teneræ,  
Z sub-




subviridis, albicans, pilosus ceu villosus, ac laxus. instar  
sacculi, umbilico cinereo, qui limbulo spadiceo fusco cir-  
cumdatus; sub cortice nucleo albo & denso; qui saporis  
fabacei subdulcis, sed non sunt in eduliis, in fabis cum  
teneræ sunt ac pellicula albicante denudantur in medio in-  
ferioris partis oculus oblongus se prodit, qui ad fabæ ro-  
tunditatem cum cuspidē versus umbilicum fabæ inflexus  
est, saporis ingrati silvestriis.

## T A B. XLIII. XLIV. XLV.

Tres hæ fabarum species peregrinæ, a nostro Authore recensitæ, omnes ad genera pertinent  
*Lobi*, cujus diversæ species à *Clusio* in *Exoticis*, & *Johanne Bauhino* Tom. 2. lib. 17. describuntur.









*Isjeria-Sametti-valli* Lat.

മല ദിക്ഷ കടൽ മാല. mal.

*Ura-valli*

ഉറവല്ലി bram.


جَهْرِيَا فَخَامِطِي وَاللَّيْ arab.



*Dalbergia*

*heterophylla* 38.







## TSJERIA-CAMETTI-VALLI.

T A B. X L V I.




*Sjeria-Cametti-Valli*; à Lusitanis, *Fabas d' Aya*, à Belgis, *Salcken*, vocantur; planta est nascens circa *Cranganoor* & *Cochien*, semper fere florens vel frugens. *Radix* fibrosa, nigricans ac interius cortice rubro, ligno albo. *Stipites* lignosi, fusci ceu nigricantes ac cum vetustiores sunt, interiori cortice rubro; cum minus vetusti, interiori viridi, teneri autem viridi cortice. *Folia* in propriis furculis tenuibus, viridibus, qui in exortu ventre extuberant, ac interius sulcati sunt, terna, quinave proveniunt, suntque oblongo-rotunda, ad pedunculum latiusculo & rotundo ambitu, & inde in cuspidem oblongum stricta, contexturâ densa & mediocriter crassiola, superficie plana, glabra, viroris in recta fusci & nitentis, in adversa dilutioris. *Costa* media albicans in adversa parte eminet. *Flores* proveniunt congregati in viridibus rotundis petiolis ceu furculis qui supra ex origine furculorum foliaceorum oriuntur, quibus pedunculis parvis viridibus, & in singulis pedunculis bini, terni adhærent; suntque parvi, fabacei, constantes quatuor foliis, qui primum cum clausi ceu in gemmis sunt ex albo-subrubescent, post aperti rubore dilutissimo seu albicantes, unum folium latius & summitati furculorum magis obversum, alterum unguiforme, & versus folium latius inflexum, ad cuius latera duo angustiora ex albo nonnihil subrubescentia ac cum stylo medio quem includit versus illud inflexum. *Stylus* qui folio unguato accumbit ac versus folium latius quoque inflexus, superne fissus in *stamina* novem tenuia albicantia, quæ flavis nodulis dotata sunt, ac in concava parte ubi lyra striatus, uno stamine quod & flavo apice nodulatum, obductus, transmittitque filamentum albicans, quod ex filiquoso viridi germine ceu stylo erumpit. *Calix* crassus, rotundus, laxis ac fusce-rubescens, flores odoris  
nu-



nullius. *Siliquæ* sunt parvæ, oblongo-rotundæ, articuli ferme longitudine, latæ unum pollicem, compressæ, viridi-dilutæ ceu viridi-flavescentes, oris rotundis, viridi fuscis, in medio latere ad unam partem oræ sinu lacunoso, venulisque ceu nervis exstantibus reticulatim in cortice utrinque pertextæ, ac proxime ad illam oram relicto intervallo nervulo extuberante viridi-fusco obductæ. Intus unum passim *semen* viride oblongum in una parte oræ rotundo ambitu, in altera medio sinu excavatum, qua sinui filiquæ affixum, lateribus duobus compressis, parum convexis ac reniformibus cavitatem filiquæ ad implens, rarius duo, in superficie venulis striantur. *Siliquæ* hæ primum valde compressæ ac foliosa planitie lateribus arcte mutuo accumbentibus, in quibus semen parvum conspicitur per tenuem ac viridi dilutum & reticulatum corticem transparentem ac maximam filiquæ capacitatem vacuum relinquens. Eandem cum priore efficaciam obtinet; *Radix* hujus tosta trita & oleo commixta linimentum fudat abscessibus externis adversum.







Penár-válli lar.  
പെനാർ വള്ളി mal.


peti  
പേടി bram.  
پنار والی arab.




Penanonia

indica. L.












Penar-valli lat.  
026736233 mal.  
Peti  
पेटी bram.  
بِقِنَارِ وَاللَّي arab.



*Peanonia indica. L.*







*PENAR-VALLI. Fœmina.*

T A B. XLVII. &amp; XLVIII.



*Penar-Valli*; à Bramannibus *Penaar*; à Lusitanis *Fruita Bandoliera*; à Belgis *Næet-Klim* vocatur; cujus natale solum est *Mangatti*, *Paroe* & alia loca, ingens & latè se dispergens planta est, florens tempore pluvioso. *Rami* virides, striati, spadicei, quorum filamenta lignosa, intus carne viridi humida interpolati, sub cuticula exteriori, quæ facile deglubitur; viridi fusci. *Folia* cum suis petiolis oblongis, tortuosis, crassis, viridi fuscis, nitentibus ac interius lato sulco striatis videntur, oblongo rotunda, angusta, antè brevi cuspide eminentia, texturâ crassa, spissa & mollia, superficie plana, viroris in recta parte saturi, umbrosi & nitentis, in adversa parum dilutioris. *Costa* media crassa est, cum lateralibus utrinque extuberans, saporis amari. *Flores* in racemis viridibus, qui supra exortum foliorum erumpunt, proveniunt, monopetali, quinque partiti, ex albicante subviridescentes; cuspides versus inferiora inflectuntur, suntque crassi ac carnosi, intus pilis albicantibus oblongis obsiti, cum pede pollicem transversum longo, qui primordium fructus est. In medio tria crassiola emicant *stamina*, in superiori parte bifida, crispata, ac sibi mutuò juncta, quæ cum tempore ita explanantur, ut in fructu ipso basin ejus triangularem constituent. *Calix* trium est foliorum. *Fructus* fasciati in pedunculis oblongis dependent, formam baltei sclopetariorum (belgicè dicimus *Bandeliers*) referentes, oblongi, tribus rotundiusculis lateribus obscurè extuberantes, circa pediculos strictiores, circa basin latiores, quæ tribus rotundiolis lateribus circumscripta est, & ex centro basi, tribus futuris ad angulos laterum striati, cortice crassiusculo, qui primò viridis, dein rufi est coloris; in medio columnam habent carneam triangularem; quam inter & corticem *semina*, ad singula columnæ latera, duo

A a

con.




confita sunt oblongo rotunda, plana in centro oblongæ membranæ, quæ tunicæ instar latus mediæ columnæ obvelat, suntque una cum fructibus saporis & odoris ut cucumeres. Ex *foliis* tritis balneum præparatur adversus corporis æstus, nervorum contractionem, minores abscessus atque carbunculos. Ex iisdem cum Vaccino *lacte* ac recenti butyro linimentum antispasmodicum conficitur.

## T A B. XLVII. XLVIII.

Quod si forma arboris *Ahoray Thereti* accuratè esset descripta, dijudicari posset utrum planta hæc enim illa conveniret, quoniam inter fructus non minima similitudo intercedit.










*Penar-valli* Mas



*Clerodendron*

*indica. L.*







*PENAR-VALLI Masc.*

TAB. XLIX.



St & *Penar-Valli* mascula apud indigenas idem nomen gerens cum priori, ac cum illa ex omni parte conveniens, præter quod hujusce *flores* quinque habeant stamina, ac nullos proferant fructus.

TAB. XLIX.

Quamvis hæc planta nomine *Penar-Valli* mascula nuncupetur, nulla tamen inter illas intercedit convenientia.



K.A.




MAJ. A. A. R. I. C. S.  
P. H. N. P. R. A. L. L. I. M. M.

OF THE  
OF THE  
OF THE  
OF THE  
OF THE

OF THE  
OF THE  
OF THE  
OF THE  
OF THE









Kātu-ulunu Lat.  
കാതുലുന Mal.  
ududi  
उडुडी bram.  
فَعَطَوُ وورونضكو Arab.



*Dolichos pubescens* W. & A.



Handwritten text in the top left corner, possibly a date or page number.


Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the upper middle section.





## KATUULINU.

TAB. L.




*K* *Atu-Ulinu*; Bramannes dicunt *Udidi*; Lusitani *Grao do Pulia*; Belgæ *Meerboonen*, planta est quæ nascitur circa *Paloerti* & aliis in locis, florens tempore pluvioso. *Radix* albicans, fibrosa. *Caules* tenues, angulati, virides & etiam ex parte rubescentes, pilis longis dense obsiti, asperi, parum lignosi. *Folia* in petiolis oblongis, viridibus, pilosis, asperis, qui ad exortum ventre viridi diluto extuberant, ac duobus foliis viridi-dilutis cuspidatis succinguntur & interius lato sunt striati fulco, terna simul proveniunt, lata, anterieus striata, pilis obsita & subaspera, viroris in recta parte surdi: medium folium latera habet uniformia, suntque saporis & odoris silvestris. *Costa* media duas laterales majores, & plures minores dispergit. *Flores* plures congregatim videntur, papilionacei, flavi, *stylum* includunt crispatum, candidum, superiori parte in tenuissima stamina fissum, flavis nodulata gemmulis. *Siliquosum germen* viride, quod oblongum, candidum ac nitens, filamentum superne barbatum emittit, in se tamquam theculam includens. *Calix* viridis, in orificio quatuor habens cuspides. *Siliquæ* oblongæ sunt, ad magnitudinem duorum digiti articulorum, rotundæ, rectæ, viridi dilutæ, pilis ruffo rubris, anteriora versus surrectis obsitæ, duabus instructæ futuris. *Fabæ* forma teretes sunt, latiori futuræ adhærentes, suntque in eduliis. Plantæ hujus vires in medicina adhucdum incognitæ.











Mikelengu Lat.

മുക്കുളം Mal.


مؤقهر منغا Arab.



*Dioscorea*

*sativa*. L.







## M U . K E L E N G U .

## T A B. L I.



*M*U-Kelengu; secundum Bramannes, *Neya*, Lusitanos, *Inhame do Cao*; Belgas, *Hondswortel*, nascitur circa *Cochien*, *Mutan*, & aliis in locis, semper virens, florens tempore pluvioso, sine fructu. *Radix* crassa, carnosae, urens, sed cocta acrimoniam deponit, ac apud indigenas in eduliis est. *Cauliculi* rotundi, lanuginosi, viridi-diluti, sub tunica lanuginosa glabro viridi saturo cortice. *Folia* formam cordis referunt, anterius in cuspidem crassiusculum ac rigidiusculum stricta, tenuia, mollia, lanuginosa, viroris clari & diluti, in adversa nempe parte, in recta, plana, glabra ac viroris saturi & nitentis, odore & sapore destituta. *Costa* media cum suis lateralibus in adversa parte eminet. *Flores* petiolis seriatim insident, penta vel hextapetali, viridi saturi, exterius nonnihil lanuginosi, latiori ac profundiori orificio, ex quo stamina quinque vel sex pro numero petalorum emicant, quæ flavis instructa sunt apicibus; in umbilico globulum continent viridem, parvo & lanuginoso excipiuntur calice. *Florum Gemmae* rotundæ, lanuginosæ, nullius odoris. *Folia* in decocto *Orizæ* trita abscessibus medentur.

## T A B. L I.

Cogomen *Kelengu* Malabares diversis communicarunt herbis & plantis. Hæc species est *Batatas* silvestris, nascens etiam in insula *Ceylone*, ubi porci cum radicibus saginantur, atque etiam jam jam in Horto Medico Amstelodamensi virens videri potest.





# I N D E X.

Prior Numerus Tabulam, posterior Paginam Indicat.

<b>A</b> Na-Mullu.		A.		Mu-Kelengu.		51.	97
		40.	73	Mucca-Piri.		13.	25
<b>B</b> Alia-Mucca-Piri.		B.		Mullen-Belleri.		6.	11
		11.	21	<b>N</b> Aga-Mu-Valli.		30	31.
Bara-Mareca.		41.	85			29.	55
Bela-Schora.		5.	9	Naga-Valli			
Bem-Pavel.		18.	35	vel			
Bilen-Schora.		5.	9	Mandar-Valli.		35.	61
<b>C</b> Aca-Palam.		C.		Nai-Corana.		19.	37
		4.	7	Nehoemeca.			
Caipa-Schora.		5.	9	<b>O</b> Rela-Modecca.		23.	45
Careloe-Vegon.		25.	49				
Cattu-Picinna.		8.	14	<b>P</b> Ada-Valam.		15.	29
Catu-Bara-Mareca.		45.	87			41.	75
Catu-Paeru.		42.	79	Paeru.		9.	17
Catu-Tsjandi.		43.	83	Pandi-Pavel.		10.	19
Covel.		14.	27	Pavel.		47.	48.
Cumbulam.		3.	5	Penar-Valli. Fœmina.		49.	93
<b>E</b> Rima-Pavel.		E.		Penar-Valli. Masc.		32.	33
		12.	23	Perin-Kaku-Valli.		34.	59
<b>K</b> Aku-Valli.		K.		Picinna.		7.	12
		36.	63	Putsja-Paeru.		37.	67
Karivi-Valli.		26.	49	<b>S</b> Chakeri-Schora.		2.	3
Katu-Ulini.		50.	95			38.	69
Konni.		39.	71	Schanga-Cuspi.		16.	31
Kudici-Valli.		27.	51	Scheru-Pada-Valli.			
<b>M</b> Andari-Valli.		M.		<b>T</b> Ota-Piri.		17.	33
		29.	55			46.	89
vel				Tsjera-Canetti-Valli.			
Naga-Valli.				<b>U</b> Lina.		28.	53
Modeca.		20.	39				
Modira-Caniram.		24.	47				



